건강관리메뉴얼

방문간호사를 위한 약품정보집

2009. 10. 31

부 산 광 역 시
부산대학교 산학협력단

이 책자는2009년도 맞춤형 방문건강관리사업 개발연구로 제작되었습니다.

차 례

▣ 약품정보

1. 약물에 대한 일반적 이해 ····· 5

2. 고혈압의 약물 ····· 10

3. 당뇨병의 약물 ····· 12

4. 흔히 사용하는 약물 ····· 14

찾아보기 ····· 142

1. 약물에 대한 일반적 이해

1) 약의 이름

- 약의 이름에는 화학명, 일반명, 상품명 등 3가지가 있다.
- 일반명은 약전에 등록된 이름으로 약마다 한 개가 있다.
- 상품명은 제약회사가 부여한 이름으로 '상표'+'제형'+규격' 등으로 붙인다.

화학명	일반명	상품명	약 모양
2-cyano-1-methyl-3-(2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylthio]ethyl)guanidine 	Cimetidine (시메티딘)	코러스 시메티딘 정 200mg (한국 코러스 주식회사)	
		국제 시메티딘 정 200mg (국제약품)	

2) 약의 분류

- 일반의약품 : 전문의약품 이외의 모든 의약품으로 안전성과 유효성이 확인되어 의사의 처방없이도 구입할 수 있는 약
- 전문의약품 : 의사의 처방이 있어야 구입할 수 있는 약

3) 약 먹는 시간

- 약효과가 나타날 때까지 걸리는 시간, 음식물이 약 흡수에 미치는 영향 등을 고려하여 약 먹는 시간이 결정된다.

구분	의미	예
식전 복용	식사하기 30분전에 복용	·식욕증진제 ·식후 혈당저하제 ·구토억제제
식간 복용	공복(식사 2시간 전 또는 2시간후)	골다공증 치료제
식후 복용	식사하고 30분후에 복용	대부분의 약물

4) 일반적인 복약시 주의사항

- 약은 정제, 캡슐제, 가루약, 과립제, 시럽제 등 다양한 형태로 가공되어 있다. 가공된 상태를 바꾸어 복용하면 약의 효과가 적거나 또는 더 크게 나타날 수 있으므로 주의한다.
  - 장에서 녹도록 준비된 정제(알약)는 약물을 부수거나 씹어서 먹게 되면 장이 아닌 위에서 녹기 때문에 생각보다 많은 양의 약을 섭취하게 된다. 위관으로 약을 투입하기 위해 약물을 부수지 않도록 한다. 또한 대상자가 경구로 약물을 복용하는 경우 부수거나 씹어서 먹지 않도록 교육한다.
  - 캡슐로 준비된 약물도 마찬가지로 위관으로 약물을 투여하기 캡슐을 벗기는 것은 과량을 투여하여 심각한 부작용을 초래할 수 있으므로 주의한다. 마찬가지로 대상자에게 캡슐을 깨물거나 벗기지 않도록 교육한다.
- 우유에 함유되어 있는 칼슘이나 철분이 약과 결합하여 약 흡수가 잘 되지 않을 수 있으므로 특별한 경우를 제외하고는 물과 함께 복용한다.
- 대부분의 약물은 위와 소장에서 녹아야 하며, 체온 정도의 미지근한 물과 함께 복용하는 것이 좋다.

5) 노인에서의 복약시 주의사항

1) 약동학적 특이성

● 노인은 약물의 흡수, 분포, 대사, 배설 등 약동학적 측면에서 성인과는 다른 양상을 보인다.

- 위산의 산도가 떨어지고, 위장관 운동이 늦어지며, 위장관으로 오는 혈류량이 감소한다. 또한 노화에 따라 위장관에서 약물을 흡수할 수 있는 부위가 줄어들게 된다. 이러한 이유로 약물의 흡수가 느려진다.
- 몸의 수분은 감소하는 반면 지방의 분포가 증가하며, 간에서 단백질 생성이 감소하여 단백질과 결합한 약물이 줄어들게 됨에 따라 약물의 분포가 쉬운 상태가 된다.
- 약물의 대사는 주로 간에서 일어나는데, 노화에 따라 간 기능이 저하됨에 따라 약물 대사가 원활히 일어나지 못해 체내 약물농도가 높아질 수 있다.
- 약물의 배설은 주로 신장에서 일어나며, 노화에 따라 신장기능이 저하됨에 따라 약물의 배설이 원활하지 않아 역시 약물의 체내 농도가 높아질 수 있다.

● 이러한 약동학적 특성의 차이로 인해 성인과 동일한 약물을 복용하더라도 성인과는 다른 약물반응을 보일 수 있으며 부작용을 초래하기도 한다. 따라서 노인에게 약물을 투여할 때는 약물의 용량에 특히 주의를 기울여야 한다.

2) 약물간의 상호작용

● 노인은 '걸어다니는 약국 (walking drugstore)'이라고 할 만큼 한 번에 여러 개의 약물을 복용하는 경우가 많다. 따라서 약물간의 상호작용이 문제가 될 수 있는데, 항상 복용하는 약물 간에 서로 상호

작용을 초래할 수 있는 약물이 없는 지를 확인한다. 참고로 'Medscape'의Drug Interaction Checker (http://www.medscape.com/druginfo/druginterchecker)를 이용하면 쉽게 약물간의 상호작용을 확인할 수 있다.

6) 약물 용량 단위 및 계산

① 약물 투여에서 주로 사용되는 단위

● 무게의 단위

- 1g(그램) = 1,000mg
- 1mg(밀리그램) = 0.001g = 1,000㎍
- 1㎍(마이크로그램) =0.001mg

● 부피의 단위

- 1 L(리터) = 1,000㎖
- 1dl(데시리터) = 100㎖ = 0.1 L
- 1㎖(밀리리터) = 0.01dl = 0.001 L

● 농도의 단위

- %(w/v) = %(무게/부피) : 고체를 액체로 녹였을 때의 백분율
  1g의 가루약을 100㎖의 증류수로 녹이면 1g/100㎖ X 100 = 1%(w/v)
- %(v/v) = %(부피/부피) : 액체를 액체로 녹였을 때의 백분율
  1㎖의 액체를 100㎖의 증류수로 녹이면 1㎖/100㎖ X 100 = 1%(v/v)
- %(w/w) = %(무게/무게) : 고체를 고체와 섞었을 때의 백분율
  1g의 가루약을 100g의 다른 가루약에 섞으면 1g/100g X 100 = 1%(w/w)

② 약물 투여량 계산

예 1) 부정맥 치료제 '1% 리도카인 주사액'의 5㎖ 앰플은 어느 정도의 리도카인을 함유하고 있는가?

답 1) 1%(w/v)라는 것은 100㎖의 증류수 중에 1g(1000mg)의 리도카인이 용해되어 있는 것을 의미한다. 즉 100㎖에 1000mg 이 녹아있으므로 5㎖ 앰플에는 50mg의 리도카인이 용해되어 있다.

예 2) 부정맥 치료제 '1% 리도카인 주사액'의 5㎖ 앰플에서 50mg을 투여할려면 몇 ㎖를 투여해야 하는가?

답 2) 1%(w/v)라는 것은 100㎖의 증류수 중에 1g(1000mg)의 리도카인이 용해되어 있는 것을 의미한다. 즉, 5㎖ 앰플에는 50mg의 리도카인이 용해되어 있어 50mg을 투여할려면 50㎖가 필요하다.

예 3) 100㎖의 생리식염수에 항생제 2g을 용해한 후 일반용 수액세트(1㎖당 15방울 떨어짐)를 이용하여 30분동안 모두 투여하고자 한다. 1분당 몇 방울을 떨어뜨리면 되는가?

답 2) 일반용 수액세트의 경우 1㎖당 15방울 떨어지면, 100㎖의 경우 1500방울이 떨어진다. 1500방울을 30분간 투여하려면 분당 50방울씩 떨어뜨리면 된다.

2. 고혈압 약물

1) 혈압이 조절되는 기전

- 혈압은 심박출량과 말초혈관저항(혈관수축)에 의해 결정된다.
- 심박출량은 심장에서 뿜어내는 혈액량으로는 심박수(맥박), 심근수축력, 혈류량에 의해 달라진다.



2) 혈압저하제의 구분

- 혈압저하제는 작용기전에 따라 이뇨제, 베타차단제, ACE 억제제, 칼슘채널차단제, 알파차단제가 있다.



(ACE : Angiotensin-Converting Enzyme, 안지오텐신전환효소)

3) 혈압저하제와 혈압을 떨어뜨리는 기전

- 이뇨제는 고혈압에서 제일 먼저 사용되는 약물로, 이들은 혈관을 확장시키는 일 이외에, 신사구체에 작용하여 전해질의 재흡수를 저해하고, 염분과 수분배설을 촉진하여 체내의 액체량을 줄임으로서 혈압을 낮춘다.
- 베타차단제는 그 작용기전이 정확하게 밝혀지지 않았지만 심박출량의 감소에 따라 말초혈관저항을 개선한다. 베타차단제는 협심증 치료에 효과가 있기 때문에 협심증이 동반된 고혈압 환자에게 권장된다. 그러나 베타차단제는심기능 억제나 천식 악화 등의 심각한 약물유해반응이 나타날 수 있으며, 갑자기 끊으면 이탈증후군(심근경색이나 돌연사 등)을 일으킬 수 있으므로 서서히 줄여야 한다.
- ACE 억제제는 ACE(안지오텐신 전환효소)를 저해함으로써 안지오텐신 Ⅱ의 생성을 저하시키고, 세동맥을 확장시켜 혈압을 떨어뜨린다. 다른 혈압저하제에 비해 심각한 부작용이 적고, 당뇨병, 통풍, 심부전 등의 합병증을 가진 환자에게도 널리 사용될 수 있어 고혈압이 있는 경우 제 1선택 약으로 사용된다.
- 칼슘채널차단제는 근육의 흥분수축에 관여하는 칼슘이온이 흘러가는 것을 억제함으로써 혈관내 평활근의 수축을 저해함으로써 혈압을 떨어뜨리는 효과가 있다. 자몽은 칼슘채널차단제와 반응하여 약물 부작용을 초래할 수 있어 주의해야 한다.
- 알파차단제는 알파수용체에 작용하여 혈관 수축을 억제하고, 말초혈관저항을 줄여줌으로써 혈압을 떨어뜨린다. 처음 투여하는 경우 실신, 어지럼증, 기립성 저혈압 등을 일으킬 수 있으므로 특히 주의해야 한다.

	작용기전				주요 약물
	심박수 (맥박)	심근 수축력	혈류량	말초혈관 저항 (혈관수축)	
이뇨제			↓		〈티아지드계이뇨제〉 ·메톨라존(metolazone) ·인다파미드(indapamide) ·클로르탈리돈(chlorthalidone) 〈고리계 이뇨제〉 ·푸로세마이드(furosemide) ·부메타니드(bumetanide) ·에타크린산(ethacrynic acid)
베타 차단제	↓	↓			·아테노롤(atenolol) ·베탁소롤(betaxolol) ·메토프로롤(metoprolol) ·프로프라노롤(propranolol) ·핀도롤(pindolol)
ACE 억제제			↓	↓	·캡토프릴(captopril) ·에날라프릴(enalapril) ·알라세프릴(alacepril) ·실라자프릴(cilazapril)
칼슘 채널 차단제	↓	↓		↓	·니페디핀(nifedipin) ·베라파밀(verapamil) ·딜티아젬(diltiazem)
알파 차단제				↓	·프라조신 (prazosin) ·테라조신(terazosin) ·독사조신(doxazosin)

3. 당뇨병 약물

1) 혈당이 조절되는 기전

● 혈액내의 포도당 수치(혈당)는 섭취된 포도당을 신속히 분해 또는 흡수를 저해하거나, 또는 자체적인 포도당 생성을 저해함으로써 떨어뜨릴 수 있다.

● 인슐린은 포도당의 분해, 근육이나 지방에서 포도당이 세포내 흡수

(인슐린민감성)에 관여한다.

2) 혈당저하제의 구분

- 인슐린분비촉진제 : 인슐린분비를 촉진하면 혈당이 떨어진다.
- 인슐린저항성개선제 : 인슐린저항성을 떨어뜨리면 혈당이 떨어진다.
- 포도당 방출 억제제 : 간에 비축되어 있던 포도당 방출을 억제하면 혈당이 떨어진다.
- 포도당 흡수 억제제 : 소장에서 포도당이 흡수되지 않도록 함으로써 혈당이 떨어진다.

3) 혈당저하제와 혈당을 떨어뜨리는 기전

종류	구분	약물	작용 기간	부작용
인슐린 분비 촉진제	설포닐우레아	톨부타미드Tobutamide (Orinase®)	8시간	체중 증가, 저혈당
		Acetohexamide(Dymelor®) Chlorpropamide(Diabenese®) 그리벤크라미드Glibenclamide (Euglucon®) Gliquidone(Glurenorm®) Glipizide(Digreen®) Gliclazide(Diamicron®) Glimepiride(Amaryl®)	18 ~ 24 시간	
인슐린 저항성 개선제	글리타존	피오글리타존(Pioglitazone) 로시글리타존(Rosiglitazone)	24 시간 이상	간독성 체중 증가
포도당 방출 억제제	바구아니드	메폴민(Metformin)	6시간	오심, 구토 설사, 복통
포도당 흡수 억제제	α-글루코시다아제 억제제	알카보스(Acarbose) 미글리톨(Miglitol)	6시간 (식전 복용)	설사, 복통

4. 흔히 사용하는 약물

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(소화기용약)
가나톤정 50mg (Ganaton)	효능	위장관조절제, 항팽만제
	일반명	이토프라이드 하이드로클로라이드 (itopride hydrochloride)
	제약회사	중외제약
	용량/용법	1회 1정 50mg씩, 1일 3회 식전경구투여
	보험약가	201원/정
	부작용	설사
	주의사항	아세틸콜린의 작용을 증강함.

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
가브스정 50mg (Galvus)	효능	경구혈당강하제
	일반명	빌다글립틴(vildagliptin)
	제약회사	한독약품
	용량/용법	50mg씩 1일 2회 아침, 저녁으로 분복
	보험약가	495원/정
	부작용	저혈당, 체중변화 거의없음
	주의사항	구토 - 식후 복용 권함

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(소화기용약)
가스모틴정 2.5, 5mg (Gasmotin)	효능	위장관조절제, 항팽만제
  D.W [5mg]	일반명	모사프리드 시트레이트 (mosapride citrate)
	제약회사	대웅제약
	용량/용법	1일 15mg을 3회 분복
	보험약가	192원/정
	부작용	설사, 구갈, 권태, 발진
	주의사항	장기간(2주이상) 투여 하지말것

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(소화기용약)
가스타제정 (Gastase)	효능	소화제
  GASTASE	일반명	씨메티콘 300mg (Simethicone 300mg) 디하이드로콜릭 에씨드 25mg (Dehydrocholic Acid 25mg)
	제약회사	한국파마
	용량/용법	1회 2정, 1일 3회, 식전 30분
	보험약가	89원/정
	부작용	변비, 설사, 구토, 구갈
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(소화기용약)
가스트렉스과립 (Gastrex)	효능	제산제, 항궤양용제
	일반명	에카벳 소듐 (ecabet sodium)
	제약회사	
	용량/용법	1회 1.5g 1포, 1일 2회 (아침식사후, 취침전)
	보험약가	338원/1.5g/포
	부작용	소화불량, 변비, 간기능 장애
	주의사항	페닐케톤뇨증시 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(간보호제)
고덱스캡슐 (Godex)	효능	간장보호제, 이담제
	일반명	아데닌 하이드로클로라이드 (adenine hydrochloride 2.5mg)
	제약회사	셀트리온
	용량/용법	1회 2캡슐, 1일 2~3회
	보험약가	434원/캡슐
	부작용	구갈, 메스꺼움, 발진
	주의사항	만성 활동성 간염, 간경화시 신중투여. 레보도파와 병용투여 금지

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
구루메포민정 250,500mg (Glumeformin)	효능	경구혈당강하제
 G M [250mg] GM 500 [500mg]	일반명	메트폴민 , 하이드로클로라이드 (metformin hydrochloride)
	제약회사	영풍제약
	용량/용법	1회 500mg, 식사와 함께 투약 1일 최대 2500mg
	보험약가	65원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	불규식한 식사, 격렬한 근육운동자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(정신신경용제)
그란닥신정 50mg (Grandaxin)	효능	항불안제
 G R [500mg]	일반명	토피소팜(tofisopam)
	제약회사	환인제약
	용량/용법	1회 1정 50mg, 1일 3회
	보험약가	103원/정
	부작용	졸림, 나른함
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
그루리스정 2mg (Gluless)	효능	경구혈당강하제
 [2mg]	일반명	글리메피리드(glimepiride)
	제약회사	한국휴텍스제약
	용량/용법	1일 1회 1mg, 아침식전
	보험약가	261원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	영양 불량 상태, 불규칙한 식사섭취, 식사거른자 주의

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
그리메피드정 1,2,4mg (Glimepid)	효능	경구혈당강하제
 [1mg]	일반명	글리메피리드(glimepiride)
	제약회사	한미약품
 [2mg]	용량/용법	초기 1일 1회 1mg 아침 식전
	보험약가	173원/정
 [4mg]	부작용	저혈당
	주의사항	영양 불량 상태, 불규칙한 식사섭취, 식사거른자 주의

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
그린페지정500mg (Greenphage)	효능	경구혈당강하제
 [500mg]	일반명	메트폴민 하이드로클로라이드 (metformin hydrocholoride)
	제약회사	진양제약
	용량/용법	1일 2~3회, 1회 500mg 식사와 함께 투여
	보험약가	49원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	불규칙한 식사, 식사 섭취량 부족, 격렬한 근육운동 시 주의

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글라디엠정 1,2,4mg (Gla-DM)	효능	경구혈당강하제
 [1mg]	일반명	글리메피리드(glimepiride)
	제약회사	유한양행
 [2mg]	용량/용법	1일 1회 1mg 아침식전
	보험약가	155원/정
 [4mg]	부작용	저혈당
	주의사항	영양 불량 상태, 불규칙한 식사섭취, 식사거른자 주의

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글로슨정 0.3mg (Glosen)	효능	경구혈당강하제
 [0.3mg]	일반명	보글리보스(voglibose)
	제약회사	대원제약
	용량/용법	1회 0.2mg, 1일 3회 식전
	보험약가	170원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	소화 및 흡수 장애 수반한 만성 장질환자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글루딘정 2mg (Gludine)	효능	경구혈당강하제
 [2mg]	일반명	글리메피리드(glimepiride)
	제약회사	태평양제약
	용량/용법	1일 1회 1mg, 아침식전
	보험약가	261원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	영양 불량 상태, 불규칙한 식사섭취, 식사거른자 주의

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 (　　)
글루리아드정 250/1.25, 500/2.5, 500/5mg(Gluriad)	효능	경구혈당강하제
 [500/2.5mg] [500/5mg]	일반명	메트폴민 하이드로클로라이드 (metformin hydrocholoride)
	제약회사	대웅제약
	용량/용법	250/1.25mg 1일 1정, 1일 최대량 500/5mg으로 1일 4정
	보험약가	134원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	상호작용이 있는 약물 투여자, 격렬하거나 장시간 운동하는 자 주의, 미코나졸 병용 투여 금지

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 (　　)
글루에이 서방정 500mg(Glu-A)	효능	경구혈당강하제
 [500mg]	일반명	메트폴민 하이드로클로라이드 (metformin hydrochloride)
	제약회사	유한양행
	용량/용법	1일 1회 1정. 저녁식사와 함께 투여 1일 최대 4정, 2000mg까지
	보험약가	90원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	불규식한 식사, 격렬한 근육운동자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글루코닐정500mg (Gluconil)	효능	경구혈당강하제
 [500mg]	일반명	메트폴민 하이드로클로라이드 (metformin hydrocholoride)
	제약회사	셀트리온
	용량/용법	1일 2~3회, 1회 500mg, 식사와 함께 투약
	보험약가	67원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	불규칙한 식사, 식사섭취량 부족, 격렬한 근육운동 자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글루코다운 오알 서방정 500, 750mg (Glucodown OR SR)	효능	경구혈당강하제
 [500mg] [750mg]	일반명	메트폴민 하이드로클로라이드 (metformin hydrocholoride)
	제약회사	한올제약
	용량/용법	1일 1회 500mg, 저녁식사와 함께 투여
	보험약가	101원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	탈수증, 설사, 구토 등의 위장장애자 투여 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글루코바이정 50, 100mg (Glucobay)	효능	경구혈당강하제
 [100mg]	일반명	아카르보스(acarbose)
	제약회사	바이엘코리아
	용량/용법	초기 1회 50mg 1일 3회 식전 투여, 이후 1회 100mg 1일 3회 식전 투여
	보험약가	111원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	위장장애, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글루코반스정 500/2.5, 500/5mg (Glucovance)	효능	경구혈당강하제
 [500/2.5mg] [500/5mg]	일반명	메트폴민 하이드로클로라이드 (metformin hydrocholoride)
	제약회사	머크주식회사
	용량/용법	500/2.5mg 1일 1정 최대 500/5mg 1일 4정
	보험약가	135원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	미코나졸, 보센탄 병용투여 금지

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글루코파지XR정 500mg (Glucophage XR)	효능	경구혈당강하제
 [500mg]	일반명	메트폴민 하이드로클로라이드 (metformin hydrocholoride)
	제약회사	머크주식회사
	용량/용법	1일 1회 500mg, 저녁식사와 함께 투여
	보험약가	148원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	불규칙한 식사, 식사섭취량 부족, 격렬한 근육운동 자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글루코파지정 250, 500, 1000mg (Glucophage)	효능	경구혈당강하제
 [250mg]	일반명	메트폴민 하이드로클로라이드 (metformin hydrocholoride)
	제약회사	머크주식회사
	용량/용법	1회 500mg, 1일 2~3회 1회 식사와 함께 복용 1일 최대 2500mg
	보험약가	61원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	불규칙한 식사, 식사섭취량 부족, 격렬한 근육운동 자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글루파정 250, 500, 850, 1000mg (Glupa)	효능	경구혈당강하제
 [250mg] [500mg] [850mg] [1000mg]	일반명	메트폴민 하이드로클로라이드 (metformin hydrocholoride)
	제약회사	다림바이오텍
	용량/용법	1일 2~3회, 1회 500mg, 식사와 함께 투약 1일 최대 2500mg
	보험약가	76원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	불규칙한 식사, 식사섭취량 부족, 격렬한 근육운동자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글루패스트정10mg (Glufast)	효능	경구혈당강하제
 [10mg]	일반명	미티글리니드 칼슘, 디하이드레이트 (mitiglinide calcium dihydrate)
	제약회사	중외제약
	용량/용법	1회 10mg, 1일 3회 매 식사 직전 투여
	보험약가	280원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	설사,구토 등의 위장장애시 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글리메피리드정 2mg (Glimepride Withus)	효능	경구혈당강하제
 [2mg]	일반명	글리메피리드(glimepiride)
	제약회사	위더스제약
	용량/용법	1일 1회 1mg, 아침식전,
	보험약가	261원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	설포닐우레아계, 설포아미드계 과민증 기왕력자 금기, 식사 거른자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글리멜정 1, 2, 3, 4mg (Glimel)	효능	경구혈당강하제
 [1mg]	일반명	글리메피리드(glimepiride)
 [2mg]	제약회사	동아제약
	용량/용법	1일 1회 1mg, 아침 식전
 [3mg]	보험약가	173원/정
	부작용	저혈당
 [4mg]	주의사항	식사 거른자, 신기능부전, 간기능 부전자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 (　　)
글리민정2mg (Glimin)	효능	경구혈당강하제
 [2mg]	일반명	글리메피리드(glimepiride)
	제약회사	경동제약
	용량/용법	1일 1회 1mg, 아침 식전 또는 첫 번째 주된 식사전
	보험약가	258원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	신기능부전, 간기능 부전자, 비대상성 내분비질환자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(중추신경용약)
글리아티린캡슐400mg (Gliatilin)	효능	뇌기능개선제
 [400mg]	일반명	콜린 알포세레이트 (choline alfoscerate)
	제약회사	대웅제약
	용량/용법	1회 1캅셀, 1일 2~3회
	보험약가	974원/캡슐
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글리원정 2, 4mg (Glyone)	효능	경구혈당강하제
  [2mg]	일반명	글리메피리드(glimepiride)
	제약회사	씨제이제일제당 제약사업본부
	용량/용법	1일 1회 1mg, 아침 식전
	보험약가	261원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	신기능 부전, 간기능 부전자, 비대상성 내분비질환자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
글리프릴정 2mg (Glipril)	효능	경구혈당강하제
  [2mg]	일반명	글리메피리드(glimepiride)
	제약회사	한국파마
	용량/용법	1일 1회 1mg, 아침 식전
	보험약가	261원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	신기능 부전, 간기능 부전자, 비대상성 내분비질환자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(소염진통제)
나부톤정 500mg (Nabuton)	효능	비스테로이드성 소염진통제
 [500mg]	일반명	나부메톤(nabumetone)
	제약회사	동성제약
	용량/용법	1일 1회 2정, 취침전 복용
	보험약가	397원/정
	부작용	설사, 소화불량, 위복부통, 발진, 두통
	주의사항	기관지 천식 환자, 아스피린 과민증 자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
네오마릴정 1, 2mg (Neomaryl)	효능	경구용 당뇨병
 [1mg]	일반명	글리메피리드(glimepiride)
	제약회사	종근당
	용량/용법	1일 1회 1mg, 아침 식전
 [2mg]	보험약가	173원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	신기능 부전, 간기능 부전자, 비대상성 내분비질환자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
노바메트 지알정 500mg(Novamet GR)	효능	경구혈당강하제
 [500mg]	일반명	메트폴민 하이드로클로라이드 (metformin hydrocholoride)
	제약회사	엘지생명화학
	용량/용법	1일 1회 500~1000mg 저녁식사와 함께 투여 1일 최대용량 2000mg
	보험약가	118원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	탈수증, 설사, 구토 등의 위장장애 시 금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
노바모핀정6.944mg (Novamopin)	효능	칼슘길항제
사진없음	일반명	암로디핀 베실레이트 (amlodipine besylate)
	제약회사	케이엠에스 제약
	용량/용법	1일 1회 5mg, 1일 최대 10mg
	보험약가	355원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	디히드로피리딘계 과민증 기왕력자 금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
노바스크정5mg (Norvasc)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
	일반명	암로디핀 베실레이트 (amlodipine besylate)
	제약회사	한국화이자제약
	용량/용법	1일 1회 5mg, 1일 최대 10mg
	보험약가	418원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	중증 저혈압, 투석을 해야하는 신부전자 신중 투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(뇌기능개선제)
뉴로메드정 400, 800mg (Neuromed)	효능	뇌기능개선제
 [800mg]	일반명	옥시라체탐(oxiracetam)
	제약회사	고려제약
	용량/용법	1회 800mg(1정), 1일 2회
	보험약가	671원/정
	부작용	흥분, 수면장애, 위장장애, 혈압상승, 시야흐림
	주의사항	신부전자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(대사용제제)
뉴로패시드정200mg (Neuropacid)	효능	당뇨병성 다발성 신경염의 완화
 N [200mg]	일반명	씨옥틱 에씨드(thioctic acid)
	제약회사	종근당
	용량/용법	1일 200~600mg, 2~3회 분할하여 식사 30분전 투여
	보험약가	285원/정
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타 (항전간제)
뉴론틴캡슐100,300, 400mg(Neurontin)	효능	신경병증성 통증 치료제
 Neurontin 100MG [100mg] Neurontin 300MG  [300mg]	일반명	가바펜틴(gabapentin)
	제약회사	제일약품
	용량/용법	300mg캡슐 1회 또는 100mg 1캡슐 3회
	보험약가	347원/캡슐
	부작용	어지러움, 졸림, 팔·다리의 부종, 조정능력 상실
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(소화기용제)
뉴부틴서방정300mg (Newbutin SR)	효능	위장관 조절제, 항팽만제
 NBT U T [300mg]	일반명	트리메부틴 말레이트 (trimebutine maleate)
	제약회사	한국유나이티드제약
	용량/용법	1일 2회, 1회 1정 공복시 복용
	보험약가	414원/정
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(순환계용약)
니세틸정 500mg (Nicetile)	효능	뇌기능개선제
 NCT [500mg]	일반명	아세틸-엘-카르니틴 하이드로클로라이드 (acetyl-L-carnitine hydrochloride)
	제약회사	동아제약
	용량/용법	1회 1정, 1일 2~3회
	보험약가	713원/정
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(제산제)
니자리딘캡슐 150mg (Nizaridine)	효능	제산제, 항궤양용제
RY NZC [150mg]	일반명	니자티딘(nizatidine)
	제약회사	아연제약
	용량/용법	1회 300mg 1일 1회 취침시 또는 1회 150mg 1일 2회 아침.저녁 투여
	보험약가	570원/정
	부작용	
	주의사항	간/신장애 자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
니트로글리세린정 0.6mg (Nitroglycerin)	효능	협심증치료제
 M M [0.6mg]	일반명	니트로글리세린 (nitroglycerin)
	제약회사	명문제약
	용량/용법	1정 구강내 녹여서 복용, 5분마다 반복투여 가능(15분간 3정)
	보험약가	33원/정
	부작용	
	주의사항	질산염제제 과민자 금기, 저혈압 자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
니페론 씨알 서방정 40mg (Niferon CR)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 40 NF [40mg]	일반명	니페디핀(nifedipine)
	제약회사	경풍약품
	용량/용법	1일 1회 40mg, 1일 최대 80mg
	보험약가	551원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	리팜피신 병용 투여 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
다오닐정 5mg (Daonil)	효능	경구혈당강하제
 LDI [5mg]	일반명	글리벤클리마이드 (glibenclamide)
	제약회사	한독약품
	용량/용법	1일 2.5mg. 1일 총 투여량 최대 15mg
	보험약가	68원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	미코나졸, 보센탄 병용 투여 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
다이미트정 250, 500mg(Daimit)	효능	경구혈당강하제
 396 [250mg] DAIMT 369 [500mg]	일반명	메트폴민 하이드로클로라이드 (metformin hydrocholoride)
	제약회사	경동제약
	용량/용법	1일 2~3회, 1회 500mg, 식사와 함께 투약. 1일 최대 2500mg.
	보험약가	37원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	불규칙한 식사, 식사 섭취량 부족, 격렬한 근육운동자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
다이아벡스정 250,500, 1000mg(Diabex)	효능	경구용 당뇨병
 [500mg]	일반명	메트폴민 하이드로클로라이드 (metformin hydrocholoride)
	제약회사	대웅제약
	용량/용법	1일 2~3회, 1회 500mg. 식사와 함께 투약.
	보험약가	94원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	불규칙한 식사, 식사 섭취량 부족, 격렬한 근육운동자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
다이크로짇정25mg (Dichlozid)	효능	이뇨제
 [25mg]	일반명	하이드로클로로씨아자이드 (hydrochlorothiazide)
	제약회사	유한양행
	용량/용법	1일 25~50mg을 1~2회 분복
	보험약가	10원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	디지털리스, 당질부신피질호르몬, 부신피질자극호르몬 투여자 신중투여,

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(효소제제)
단젠정 5mg (Danzen)	효능	소염효소
 DZN [5mg]	일반명	세라티오펩티다아제 (serratiopeptidase)
	제약회사	씨제이제일제당 제약사업본부
	용량/용법	1회 5~10mg, 1일 3회 식후
	보험약가	49원/정
	부작용	
	주의사항	항응고제, 카르바마제핀, 진해제 투여자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진통소염제)
더모베이트 연고 (Dermovate)	효능	국소용 코르티코스테로이드제 (진통, 진양, 소염제)
 더모베이트 연고 10 grams GlaxoWellcome [0.05% 0.5mg g]	일반명	클로베타솔-18-프로피오네이트 (clobetasol-17-propionate 0.05% 0.5mg/g)
	제약회사	글락소 스미스클라인
	용량/용법	1일 1~2회 적량
	보험약가	87원/g
	부작용	각화이상증, 색소침착
	주의사항	2주이상 연용 또는 1주에 50g이상 사용 금

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항불안제)
데파스정 0.25, 0.5, 1mg (Eepas)	효능	항불안제
[0.25mg] [0.5mg] [1mg]	일반명	에티졸람(etizolam)
	제약회사	종근당
	용량/용법	1일 3mg, 3회 분복, 고령자:1일 1.5mg 이내
	보험약가	137원/정
	부작용	
	주의사항	벤조디아제핀계 약물에 과민증 시 투약금기, 수면제, 진통제, 항우울약, 리튬에 의한 급성 중독시 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항전간제)
데파코트정 250, 500mg (Depakote)	효능	항전간제
 [250mg] [500mg]	일반명	디발프로엑스 소듐 (divalproex sodium 250mg)
	제약회사	한국애보트
	용량/용법	15mg/kg/day. 1일 최대 60mg/kg
	보험약가	159/정
	부작용	
	주의사항	카바페넴계항생물질 투여자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(소화기용제)
돔필정 10mg (Dompil)	효능	위장관 조절제, 항팽만제
 S.P [10mg]	일반명	돔페리돈 말레이트 (domperidone maleate)
	제약회사	신풍제약
	용량/용법	1회 1~2정씩 1일 3회
	보험약가	57원/정
	부작용	유즙분비, 위운동 촉진
	주의사항	간손상자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(하제)
둘코락스 에스정 (Dulcolax-s)	효능	하제, 변비제
	일반명	도큐세이트 소듐 (docusate sodium)
	제약회사	한국베링거인겔하임
	용량/용법	1일 1회 2정을 취침전
	보험약가	?-미기재
	부작용	일주일 이상 사용시 변비
	주의사항	심한복통, 구토 시 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(하제)
듀파락시럽 (Duphalac)	효능	하제, 변비제
 [0.67g ml]	일반명	락툴로즈 콘(lactulose cone)
	제약회사	중외제약
	용량/용법	아침식전 투여. 1일 10~15ml. 1일 최대 45ml.
	보험약가	17원/ml
	부작용	복통, 복부팽창, 트림, 복부불쾌, 설사, 오심, 구토
	주의사항	과당 불내성자, 포도당, 갈락토스 흡수장애 증후군 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타(강심제)
디고신정 0.25mg (Digosin)	효능	심질환용제
 [0.25mg]	일반명	디곡신(digoxin)
	제약회사	씨제이 제일제당 제약사업본부
	용량/용법	1일 0.25~0.5mg
	보험약가	29원/정
	부작용	어지러움, 졸림, 불규칙한 심박동, 피부발진
	주의사항	디기탈리스 중독, 폐쇄성 심근병증 시 금기, 임의로 양을 가감 또는 두배의 용량을 복용하지 않는다.

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
디란트정 25mg (Dirant)	효능	혈압강하제(베타차단제)
 J-1 [25mg]	일반명	칼베디롤(carvedilol)
	제약회사	진양제약
	용량/용법	첫 이틀 1일 1회 12.5mg ,이후 1일 1일 1회 25mg 2주간 복용
	보험약가	632원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	베타차단제에 심한 과민증 기왕력자, 건선 기왕력 또는 가족력자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
디스그렌캡슐 150, 300 mg(Disgren)	효능	항응고제, 항혈소판제, 혈전용해제, 기타의 순환계용약
 [150mg]	일반명	트리플루잘(triflusal)
	제약회사	명인제약
	용량/용법	성인 300~900mg을 식사중 또는 식후 분복
	보험약가	514원/캡슐
 [300mg]	부작용	위통, 연하곤란, 속쓰림, 소화불량, 출혈경향
	주의사항	살리실산 유도체 과민자, 소화성궤양의 기왕력자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
디아미크롱정80mg (Diamicron)	효능	경구혈당강하제
 [80mg]	일반명	글리클라자이드(gliclazide 30mg)
	제약회사	한국세르비에
	용량/용법	1일 1회 30~120mg
	보험약가	119원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	영양불량상태, 불규칙적인 식사섭취, 허약상태, 격렬한 운동 시 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항불안제)
디아제팜정 2, 5mg (Diazepam)	효능	항불안제, 정신신경용제
 [2mg]	일반명	디아제팜(diazepam 2mg)
	제약회사	삼진제약
	용량/용법	1회 2~10mg을 1일 2~4회 고령자 및 쇠약자 : 초회량 2~2.5mg을 1일 1~2회
 [5mg]	보험약가	23원/정
	부작용	졸림, 협조운동장애
	주의사항	수면제, 진통제, 항정신병약, 항우울약, 리튬에 의한 급성 중독 시 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
디엔정 50, 100mg (Dien)	효능	말초혈관 확장제, 뇌기능 개선제
 WK4 [100mg]	일반명	니카메테이트 시트레이트 (nicametate citrate 100mg)
	제약회사	한국웨일즈제약
	용량/용법	1일 150~300mg을 3회 분복
	보험약가	164원/정
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(제산제)
디오겔현탁액 (Diogel susp)	효능	제산제
 [3.8g 17g]	일반명	디오마그네이트 (diomagnate)
	제약회사	녹십자
	용량/용법	식수 및 통증시 1포, 그대로 또는 반컵의 물에 녹여서 복용
	보험약가	19원/g
	부작용	위장관의 불쾌감, 설사
	주의사항	중증 신부전 시 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
디오반필름코팅정 40,80,160,320mg (Diovan)	효능	혈압강하제(안지오텐신 II길항제)
 D V NVR [80mg]	일반명	발사르탄(valsartan 80mg)
	제약회사	한국 노바티스
	용량/용법	1일 1회 80mg, 식사 중 또는 식간. 1일 160mg까지 증량 가능. 추가적인 혈압강하 필요시 1일 최대 320mg
 DX DX NVR [160mg]	보험약가	977원/정
	부작용	두통, 어지럼증, 설사, 피로, 현기증
	주의사항	노인에게서 NSAID와 병용시 수분 보충 필요함.

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
디크라핀지속정 2.5, 5mg (Decreapin SR)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 DBP 5 [5mg]	일반명	펠로디핀(felodipine 5mg)
	제약회사	보람제약
	용량/용법	초기 1일 1회 5mg ,유지 1일 5~10mg 아침. 1일 최대 20mg
	보험약가	451원/정
	부작용	
	주의사항	고령자, 심부전, 저혈압자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
딜라스트캡슐10mg (Dilast)	효능	말초혈관 확장제, 뇌기능 개선제
 CKD IBD [10mg]	일반명	이부딜라스트 (ibudilast 10mg)
	제약회사	종근당
	용량/용법	성인 1회 10mg, 1일 3회
	보험약가	220원/캡슐
	부작용	혈소판 감소
	주의사항	뇌경색 급성기, 간기능 장애, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
딜라트렌정 6.25, 12.5, 25mg (Dilatrend)	효능	혈압강하제(베타차단제)
 B M P 1 [6.25mg] B M H 3 [12.5mg] B M D 5 [25mg]	일반명	칼베디롤 (carvedilol 25mg)
	제약회사	종근당
	용량/용법	첫 이틀 1일 1회 12.5mg, 이후 1일 1회 25mg. 통상 2주 복용. 증량시 1회 25mg 1일 2회 1회 최대 25mg, 1일 최대 50mg
	보험약가	786원/정
	부작용	어지러움, 두통, 피로, 고도의 서맥, 저혈압
	주의사항	베타차단제 심한 과민증 기왕력 자, 건선 기왕력자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항진균제)
라미실 크림 1% (Lamisil)	효능	국소용 항진균제
 [1%/10mg]	일반명	테르비나핀 하이드로클로라이드 (terbinafine hydrochloride)
	제약회사	한국노바티스
	용량/용법	1일 1~2회
	보험약가	439원/g
	부작용	발진, 발적, 가려움, 두드러기
	주의사항	본제 성분 과민증 또는 가왕력자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(지사제)
라시도필캡슐20mg (Lacidofil)	효능	정장제, 지사제
 LCF [20mg]	일반명	락토바실러스 람노서스 (lactobacillus rhamnosus)
	제약회사	한국팜비오
	용량/용법	1회 1캡슐, 1일 2회. 식중/식후 30분 이내 투약
	보험약가	266원/캡슐
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
라식스정 40mg (Lasix)	효능	이뇨제
 DLI [40mg]	일반명	퓨로세마이드 (furosemide)
	제약회사	한독약품
	용량/용법	1일 80mg 2회 분복
	보험약가	49원/정
	부작용	전해질평형실조, 기립성저혈압, 식욕부진, 혈액량감소, 무력감
	주의사항	전해질 불균형 발생 고위험자, 디기탈리스제제, 당질코르티코이드, 부신피질자극호르몬 투여자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(제산제)
라피드정 100mg (Rapide)	효능	제산제, 항궤양용제
사진없음	일반명	레바미피드(rebamipide)
	제약회사	수성약품
	용량/용법	1회 100mg, 1일 3회(아침, 저녁, 취침전)
	보험약가	154원/정
	부작용	
	주의사항	본제성분 과민증 기왕력자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(지사제)
락토웰 장용캡슐 250mg (Lactowel)	효능	지사제, 정장제
 CKD LTW [250mg]	일반명	컬쳐드 바실러스 서브틸리스 (cultured Bacillus subtilis)
	제약회사	종근당
	용량/용법	1회 125~250mg, 1일 2~3회
	보험약가	144원/캡슐
	부작용	
	주의사항	의사치료중인자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(지사제)
락톨캡슐 170mg (Raktol)	효능	지사제, 정장제
 JY RKT [170mg]	일반명	락토바실러스 에씨도필러스 틴달라이즈드 라이오필리제이트 (lactobacillus acidophilus tyndalized lyophilizate)
	제약회사	진양제약
	용량/용법	1일 2~4캡슐 분복
	보험약가	98원/캡슐
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(제산제)
란스톤캡슐 15, 30mg (Lanston)	효능	위산억제제, 항궤양용제
 LST 15mg [15mg] LST LST [30mg]	일반명	란소프라졸(lansoprazole)
	제약회사	제일약품
	용량/용법	1일 1회 15mg
	보험약가	1,070원/캡슐
	부작용	
	주의사항	약물과민증 기왕력자, 간장애 자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타
란투스주 솔로스타 (Lantus Solostar)	효능	인슐린 제제
 [300IU/3ml]	일반명	인슐린글라진 (Insulin glargine)
	제약회사	사노피아벤티스코리아
	용량/용법	1일 1회 피하주사 (용량은 대상자에 따라 조정)
	보험약가	15,401원/3ml/관
	부작용	저혈당증
	주의사항	인슐린글라진 과민자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(간보호제)
레가론캡슐 70,140mg (Legaron)	효능	간장보호제
 레가론 140 [140mg]	일반명	칼듀스 마리마누스
	제약회사	부광약품
	용량/용법	초기 : 1회 2캡셀, 1일 3회 유지 : 1회 1캡셀, 1일 3회
	보험약가	169원/캡슐
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(제산제)
레바넥스정 100,200mg (Revanex)	효능	제산제, 항궤양용제
 [100mg]	일반명	레바프라잔 (revaprazan 200mg))
	제약회사	유한양행
	용량/용법	1일 1회 200mg
	보험약가	1,032원/정
 [200mg]	부작용	
	주의사항	신기능 부전, 간장애, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
레보텐션정2.5mg (Revotension)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 A G L T [2.5mg]	일반명	에스-암로디핀 베실레이트 (s-amlodipine besylate)
	제약회사	안국약품
	용량/용법	1일 1회 2.5mg. 1일 최대 5mg
	보험약가	516원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	디히드로피리딘계 약물 과민증 기왕력자 금기, 투석해야 하는 신부전 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진해거담제)
레보피린정 60mg (Levopirin)	효능	기침, 감기용제, 진해거담제
 LV 60 [60mg]	일반명	레보드로프로피진 (levodropropizine)
	제약회사	영풍제약
	용량/용법	1회 1정(60mg), 1일 3회
	보험약가	173원/정
	부작용	
	주의사항	심각한 신부전자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(소화기용제)
레보필정25mg (Levopil)	효능	위장관 조절제, 항팽만제
 25 L [25mg]	일반명	레보설피리드 (levosulpiride)
	제약회사	종근당
	용량/용법	성인 1회 1정, 1일 3회 식전
	보험약가	177원/정
	부작용	
	주의사항	위장관운동자극이 유해한자, 간질이 있는 자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진해거담제)
레브로콜정 60mg (Lebrocol)	효능	기침, 감기용제, 진해거담제
 LB HM [60mg]	일반명	레보드로프로피진 (levodropropizine)
	제약회사	한미약품
	용량/용법	1회 1정, 1일 3회
	보험약가	173원/정
	부작용	
	주의사항	심각한 신부전자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(간보호제)
레비셀정 25mg (Lebicel)	효능	간장보호제
 LB LB [25mg]	일반명	비페닐-디메틸-디카르복실레이트 (biphenyl-dimethyl-dicarbox ylate)
	제약회사	대우제약주식회사
	용량/용법	1회 1~2정, 1일 3회
	보험약가	167회/정
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
레스콜 XL 서방정 80mg(Lescol XL SR)	효능	항고지혈증제, 동맥경화용제
 NVR LE [80mg]	일반명	플루바스타틴(fluvastatin)
	제약회사	한국노바티스
	용량/용법	1일 1회 저녁에 20~40mg, 1일 1회 최대 80mg.일정 시간에 음식 섭취와 관계없이 복용
	보험약가	1,070원/정
	부작용	두통, 피로, 불면, 소화불량
	주의사항	효과적인 작용을 위해 저녁에 복용, 심한 근육통, 근육질환 의심 시 투여 중지.

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항우울제)
렉사프로정 5, 10, 20mg(Lexapro)	효능	항우울제, 정신신경용제
 [10mg]	일반명	에스시탈로프람 옥살레이트 (escitalopram oxalate)
	제약회사	환인제약
	용량/용법	1일 1회 10mg, 1일 최대 20mg
	보험약가	932원/정
	부작용	
	주의사항	비선택적, 비가역적 MAO 저해제 투여중인 자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
로바타딘정20mg (Lovatadin)	효능	항고지혈증제, 동맥경화용제
 [20mg]	일반명	로바스타틴(lovastatin)
	제약회사	대한뉴팜
	용량/용법	1일 20~80mg정, 수회 분복
	보험약가	541원/정
	부작용	두통, 무력감, 불면, 횡문근 융해증
	주의사항	수회 분복하되 식이요법병행

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
로자탐 플러스에프정 (Losartam plus F)	효능	혈압강하제(기타)
 ID L3	일반명	하이드로클로로씨아자이드 (hydrochlorothiazide 25mg) 로자탄 포타슘 (losartan potassum 100mg)
	제약회사	일동제약
	용량/용법	1일 1회 1정
	보험약가	576원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	설폰아미드계 약물 과민증자 투여 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
로피드캡슐300mg (Lopid)	효능	항고지혈증제,동맥경화용제
 Lopid PD669 [300mg]	일반명	겜피브로질(gemfibrozil)
	제약회사	제일약품
	용량/용법	1일 1200mg, 2회 분복, 아침.저녁 식전 30분
	보험약가	216원/캡슐
	부작용	소화불량, 피로, 어지러움, 두통, 탈모
	주의사항	저알부민혈증(신증후군)자 신중투여, 레파글리니드와의 병용 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진해거담제)
록솔정 30mg (Roxol)	효능	기침, 감기용제, 진해거담제
 RX [30mg]	일반명	암브록솔 하이드로클로라이드 (ambroxol hydrochloride)
	제약회사	삼아제약
	용량/용법	1회 30mg, 1일 3회
	보험약가	34원/정
	부작용	졸리움
	주의사항	과당불내성자 금기, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 ■관절염 ■기타(소염진통제)
루마겔 3% (Rheuma gel)	효능	비스테로이드성 소염진통제
 루마겔 [30mg]	일반명	케도프로펜(ketoprofen)
	제약회사	한미약품
	용량/용법	적량 1일 1~4회
	보험약가	70원/g
	부작용	두드러기
	주의사항	기관지 천식 있는자 신중투여, 아스피린 천식 또는 그 기왕력자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(비만치료제)
리덕틸캡슐 10, 15mg (Reductil)	효능	체중유지를 포함한 비만치료
 Reductil 10mg [10mg] Reductil 15mg [15mg]	일반명	시부트라민 하이드로클로라이드(sibutramine hydrochloride)
	제약회사	한국애보트
	용량/용법	1일 1회 식사와 관계없이 아침에 10mg 복용
	보험약가	
	부작용	두근거림, 부작용, 손떨림
	주의사항	MAO 저해제 투여자 병용 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(중추신경용제)
리리카캡슐 75, 150mg (Lyrica)	효능	신경병증성 통증 치료제
 pifzer PGN 75 [75mg] pifzer PGN 150 [150mg]	일반명	프리가발린(pregabalin 150mg)
	제약회사	제일약품
	용량/용법	1일 2회 분복, 음식물과 상관없이 투여
	보험약가	1,309원/캡슐
	부작용	시야혼탁, 시력 변화
	주의사항	당뇨환자, 혈관부종, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
리바로정 2mg (Livalo)	효능	항고지혈증제, 동맥경화용제
  [2mg]	일반명	피타바스타틴 칼슘 (pitavastatin calcium)
	제약회사	중외제약
	용량/용법	1일 1~2mg, 1일 1회 저녁식후 1일 최대 4mg
	보험약가	952원/정
	부작용	
	주의사항	투여전 및 투여중 반드시 표준 콜레스테롤 저하식 필요.

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항전간제)
리보트릴정 0.5mg (Rivotril)	효능	항전간제
  [0.5mg]	일반명	클로나제팜 (clonazepam)
	제약회사	한국로슈
	용량/용법	초회 : 1일 1.5mg 3회 분복 유지 : 1일 3~6mg 1회
	보험약가	30원/정
	부작용	졸음, 어지러움, 무기력, 보행이상, 호흡곤란
	주의사항	급성중독시 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
리카디핀정 10mg (Licardipine)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 P [10mg]	일반명	레르카니디핀 하이드로클로라이드 (lercanidipine hydrochloride)
	제약회사	태평양제약
	용량/용법	1일 1회 10mg, 최소 식사 15분 전
	보험약가	325원/정
	부작용	홍조, 두통, 현기증, 소화불량,
	주의사항	간장애 환자, 협심증 병력이 있는 환자, 알코올 섭취 환자 신중 투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(부정맥용제)
리트모놈정 150, 300mg(Rytmonorm)	효능	심질환용제, 부정맥용제
 150 [150mg]	일반명	프로파페논 하이드로클로라이드 (propafenone hydrochloride)
	제약회사	일성신약
	용량/용법	1일 450~600mg, 900mg까지 증량 가능
 300 [300mg]	보험약가	472원/정
	부작용	
	주의사항	기초 심질환, 현저한 동서맥, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(대사제제)
리포에이 HR정 600mg(Lipo-A HR)	효능	당뇨병성 다발성 신경염의 완화
	일반명	씨옥틱 에씨드 (thioctic acid)
	제약회사	다림바이오텍
	용량/용법	1일 1회 600mg, 아침식사 30분전 복용
	보험약가	601원/정
	부작용	복부통증, 구토, 소화불량, 두드러기, 소양감, 속쓰림
	주의사항	본제 과민반응 기왕력자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
리피논정 10, 20, 40mg (Lipinon)	효능	항고지혈증제, 동맥경화용제
 10 LPT [10mg]	일반명	아토르바스타틴 칼슘 안하이드로스 (atorvastatin calcium anhydrous)
	제약회사	동아제약
 20 LPT [20mg]	용량/용법	식사와 관계없이 투약 1일 1회 20 또는 40mg. 1일 최대 80mg
	보험약가	843원/정
 40 LPT [40mg]	부작용	두통, 무력감, 불면, 횡문근 융해증
	주의사항	표준 콜레스테롤 저하식 병행

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
리피딜 슈프라정 160mg (Lipidil supra)	효능	항고지혈증제, 동맥경화증제
 160 [160mg]	일반명	페노피브레이트(fenofibrate)
	제약회사	녹십자
	용량/용법	1일 1회 160mg을 식후 즉시
	보험약가	579원/정
	부작용	두통, 무력감, 어지러움
	주의사항	반드시 식이요법 병행, 저알부민혈증, 간기능 장애시 신중 투여.

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
리피로우정 10,20,40,80mg (Lipilou)	효능	항고지혈증제, 동맥경화증제
 LPL 10 [10mg] LPL 20 [20mg] LPL 40 [40mg] LPL 80 [80mg]	일반명	아토르바스타틴 칼슘 안하이드로스(atorvastatin calcium anhydrous)
	제약회사	종근당
	용량/용법	식사와 관계없이 투약 1일 1회 10mg, 최대 1일 80mg
	보험약가	757원/정
	부작용	두통, 무력감, 불면
	주의사항	표준 콜레스테롤 저하식 병행.

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
리피칸정 10, 20, 40mg(Lipikhan)	효능	항고지혈증제, 동맥경화증제
 [10mg] [10mg]	일반명	아토르바스타틴 칼슘 안하이드로스(atorvastatin calcium anhydrous)
	제약회사	신일제약
	용량/용법	식사와 관계없이 복용. 1일 1회 10mg , 1일 1회 10~80mg 용량범위로 투여
	보험약가	757원/정
	부작용	두통, 무력감, 불면, 횡문근 융해증
	주의사항	표준 콜레스테롤 저하식 병행

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
리피토정 10,20, 40,80mg (Lipitor)	효능	항고지혈증제, 동맥경화증제
 [10mg] [20mg] [40mg]	일반명	아토르바스타틴 칼슘 (atorvastatin calcium)
	제약회사	한국화이자제약
	용량/용법	식사와 관계없이 복용. 1일 1회 10mg , 1일 1회 10~80mg 용량범위로 투여
	보험약가	954원/정
	부작용	두통, 무력감, 불면, 횡문근 융해증
	주의사항	표준 콜레스테롤 저하식 병행

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(제산제)
마그밀정 500mg (Magmil)	효능	제산제, 항궤양용제, 하제
 M M [500mg]	일반명	마그네슘 하이드록시드 (magnesium hydroxide)
	제약회사	삼남제약
	용량/용법	위, 십이지장 궤염, 위염, 위산과다 : 1일 1~2.5g 수회 분복 변비증 : 1일 1~2g, 1~2회 분복
	보험약가	18원/정
	부작용	설사
	주의사항	고마그네슘혈증 시 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
마디핀정 5, 10, 20mg(Madipine)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 CJ MD1 [10mg]	일반명	마니디핀 하이드로클로라이드 (manidipine hydrochloride)
	제약회사	씨제이 제일제당 제약사업본부
	용량/용법	초회 : 1일 5mg, 유지 : 1일 1회 10~20mg
	보험약가	489원/정
 CJ MD2 [20mg]	부작용	결막충혈, 빈뇨, 안면홍조, 부종, 오심, 구토, 간기능검사 수치 증가
	주의사항	심한 간기능장애, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(지사제)
메디락-디에스캡슐 250mg(Medilac-DS)	효능	지사제, 정장제
 메디락DS 10억생균 [250mg]	일반명	컬쳐드 바실러스 서브틸리스 (cultured Bacillus subtilis)
	제약회사	한미약품
	용량/용법	1캡셀, 1일 2~3회
	보험약가	180원/캡슐
	부작용	변비, 복부팽만감
	주의사항	간장애, 중증의 신부전 환자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(지사제)
메디락 에스캡슐 (Medilac-S)	효능	지사제, 정장제
 메디락S 5억생균	일반명	바실러스 서브틸리스 (Bacillus subtilis)
	제약회사	한미약품
	용량/용법	1회 1~2캡셀, 1일 2~3회
	보험약가	118원/캡슐
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
메바로친정 5, 10, 20, 40mg(Mevalotin)	효능	항고지혈증제, 동맥경화제
 M10 [10mg] 20 [20mg] 40 [40mg]	일반명	프라바스타틴 소듐 (pravastatin sodium)
	제약회사	씨제이 제일제당 제약사업본부
	용량/용법	1일 1회 10~40mg
	보험약가	
	부작용	발진, 복통, 횡문근 융해증 수반, 위부팽만감
	주의사항	피브레이트계 약물, 면역억제제, 니코틴산에리스로마이신 투여자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
메트그린 SR정 500mg (Metgreen-SR)	효능	경구혈당강하제
 MSR [500mg]	일반명	메트폴민 하이드로클로라이드 (metformin hydrochloride)
	제약회사	녹십자
	용량/용법	1일 1회 1정, 저녁식사와 함께 투여. 최대 1일 4정.
	보험약가	118원/정
	부작용	저혈당, 설사, 오심, 구토, 불쾌하 거나 금속맛, 발진, 혈소판 감소,
	주의사항	식사 섭취량 부족, 격렬한 근육운동 자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(갑상선기능저하제)
메티마졸정 5mg (Methimazole)	효능	갑상선기능저하제
 MET [5mg]	일반명	메티마졸(methimazole)
	제약회사	부광약품
	용량/용법	1일에 경증 15mg(3정), 중등도 30~40mg(6~8정), 중증 60mg(12정)을 8시간 간격으로 3회 분복
	보험약가	39원/정
	부작용	가려움증, 백혈구 수치 감소
	주의사항	간장애, 혈액장애시 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 ■관절염 ■기타(소염진통제)
멜콕스캡슐 7.5, 15mg (Melcox)	효능	비스테로이드성 소염진통제, 해열, 진통, 소염제
 MCX 7.5mg [7.5mg]	일반명	멜록씨캄(meloxicam)
	제약회사	동아제약
	용량/용법	식사 중 물 또는 음료수와 복용할 것
	보험약가	592원/캡슐
 MCX 15mg [15mg]	부작용	위장 궤양, 출혈
	주의사항	코르티코스테로이드, 항응고제 투여자, 위장출혈자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(소화기용제)
모티리움 엠정 10mg (Motilitum M)	효능	위장관 조절제, 항팽만제
 [10mg]	일반명	돔페리돈 말레이트 (domperidone maleate)
	제약회사	한국얀센
	용량/용법	1회 1~3정(레보도파투여시 0.5~1정) 1일 3회
	보험약가	88원/정
	부작용	유즙분비, 위운동 촉진
	주의사항	위운동 촉진이 위험한자, 프로락틴 분비성 하수체증자금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
몰시톤정 2.4mg (Molsiton)	효능	협심증 치료제, 혈관확장제
 [2mg]	일반명	몰시도민(molsidomine)
	제약회사	경풍약품
	용량/용법	1회 2mg, 1일 3회. 최대 1회 4mg
	보험약가	147원/정
	부작용	빈맥, 심계항진
	주의사항	실데나필 복용자, 저혈압자 금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
무노발정2.5, 5mg (Munobal)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 HFC 5 [5mg]	일반명	펠로디핀(felodipine)
	제약회사	한독약품
	용량/용법	초기 : 1일 1회 5mg 유지 : 1일 5~10mg, 아침 1일 최대 20mg
	보험약가	560원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	심부전, 고령자 신중투여, 갈락토오스 불내성, 중증 간기능장애자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(제산제)
무코스타정100mg (Mucosta)	효능	제산제, 항궤양용제
 OG 33 [100mg]	일반명	레바미피드(rebamipide)
	제약회사	한국오츠카제약
	용량/용법	1회 100mg, 1일 3회(아침, 저녁, 취침전)
	보험약가	188원/정
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(근이완제)
뮤렉스정 50mg (Mulex)	효능	골격근이완제, 근이완제
 MLX [50mg]	일반명	에페리손 하이드로클로라이드 (eperisone hydrochloride)
	제약회사	초당약품
	용량/용법	1회 50mg, 1일 3회
	보험약가	212원/정
	부작용	
	주의사항	중증 근무력증 자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진해거담제)
뮤코텐정 200mg (Mucoten)	효능	기침, 감기용제, 진해거담제
 YP [200mg]	일반명	메틸 엔, 에스-디아세틸-엘-치스타이네이트(methyl N, S-diacetyl-L-cysteinate)
	제약회사	영풍제약
	용량/용법	1회 1정, 1일 3회
	보험약가	100원/정
	부작용	
	주의사항	위장관 점막병소 있는 화나, 타약물 투여중인자 신중투여, 신장애자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진해거담제)
뮤테란캡슐100,200mg (Muteran)	효능	기침, 감기용제, 진해거담제
 Hanwha MUC100 [100mg] Hanwha MUC200 [200mg]	일반명	아세틸시스테인 (acetylcysteine)
	제약회사	한화제약
	용량/용법	1회 200mg 1일 3회 식전에 소량의 물과 함께 복용
	보험약가	152원/캡슐
	부작용	
	주의사항	위·십이지장궤양자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
미아릴정 2mg (Miaryl)	효능	경구혈당강하제
 JY [2mg]	일반명	글리메피리드 (glimepiride)
	제약회사	진양제약
	용량/용법	1일 1회 1mg, 아침식전
	보험약가	250원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	설포닐우레아계, 설폰아미드계 과민증 기왕력자 금기, 식사 거른자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(근이완제)
미오날정 50mg (Myonal)	효능	골격근이완제, 근이완제
 MN [50mg]	일반명	에페리손 하이드로클로라이드(eperisone hydrochloride)
	제약회사	태평양제약
	용량/용법	1회 1정, 1일 3회
	보험약가	161원/정
	부작용	
	주의사항	중증 근무력증 자 금기, 타르트라진 성분 과민자 신중 투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
미카르디스 플러스정 40, 80mg(Micardis plus)	효능	혈압강하제(기타)
 [40/12.5mg] [80/12.5mg] [80/20mg]	일반명	텔미사르탄 (telmisartan 40mg) 하이드로클로로씨아자이드 (hydrochlorothiazide 12.5mg)
	제약회사	한국베링거인겔하임
	용량/용법	1일 1회 음료와 함께 복용
	보험약가	804원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	설폰아미드 계열 과민증자, 불응성 저칼륨혈증·과칼슘혈증자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항불안제)
바리움정 2, 5mg (Valium)	효능	항불안제, 정신신경용제
 [2mg] [5mg]	일반명	다이아제팜(diazepam)
	제약회사	한국로슈
	용량/용법	1회 2~10mg을 1일 2~4회
	보험약가	23원/정
	부작용	불안, 흥분, 우울, 자극과민
	주의사항	항정신병약, 항우울약, 리튬에 의한 급성 중독자 신중투여, 벤조디아제핀계 약물 과민증자 금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
바소트롤정 12.5, 25mg (Vasotrol)	효능	혈압강하제(베타차단제)
 [12.5mg] [25mg]	일반명	칼베디롤(carvedilol 25mg)
	제약회사	동아제약
	용량/용법	1일 1회 25mg
	보험약가	544원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	MAO 억제제 복용자 금기, B-차단제에 의한 건선 기왕력자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타
바소트리정 20mg (Vasotri)	효능	협심증 치료제, 혈관확장제
 D DV [20mg]	일반명	트리메타지딘 디하이드로클로라이드(trimetazidine dihydrochloride)
	제약회사	동구제약
	용량/용법	1회 200mg 1일 2회
	보험약가	89원/정
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타
바스티난정 20mg (Vastinan)	효능	협심증 치료제, 혈관확장제
 V [20mg]	일반명	트리메타지딘 디하이드로클로라이드(trimetazidine dihydrochloride)
	제약회사	한국세르비에
	용량/용법	1일 20mg, 1일 2회. 최대 60mg/day
	보험약가	133원/정
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항응고제)
베셀듀에프 연질캡슐 (Vessel Due F)	효능	항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제(혈전용해제)
	일반명	솔루덱사이드(sulodexide)
	제약회사	아주약품공업
	용량/용법	1회 1캅셀, 1일 2회
	보험약가	607원/캡슐
	부작용	출혈
	주의사항	출혈체질자, 헤파린 약물 과민자 금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
베아디핀정 5mg (Beardipine)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 D.W [5mg]	일반명	암로디핀 니코티네이트 (amlodipine nicotinate)
	제약회사	대웅제약
	용량/용법	1일 1회 5mg
	보험약가	413원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	디히드로피리딘계 약물 과민증 기왕력자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
베이슨정 0.2, 0.3mg (Basen)	효능	경구혈당강하제
 [0.2mg] [0.3mg]	일반명	보글리보스(voglibose)
	제약회사	씨제이 제일제당 제약사업본부
	용량/용법	1회 0.2mg, 1일 3회 식전
	보험약가	201원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	장내가스의 발생 증가에 의해서 증상 악화되는 자, 타 혈당강하제 투여 중인 자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(지사제)
벤투룩스캡슐30mg (Ventrux)	효능	정장제, 지사제
 SF 68 V-30 [30mg]	일반명	스트렙토코커스 페시움 스트레인 세르넬(streptococcus faecium strain cernelle)
	제약회사	동구제약
	용량/용법	1회 1캅셀, 1일 3회
	보험약가	87원/캅셀
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
보글리코스정 0.2, 0.3mg(Voglicose)	효능	경구혈당강하제
  [0.2mg] [0.3mg]	일반명	보글리보스(voglibose)
	제약회사	유한양행
	용량/용법	1회 0.2mg, 1일 3회 식전
	보험약가	198원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	장내가스의 발생 증가에 의한 증상 악화자, 타 혈당 강하제 투여자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항현훈제)
보나링 에이정 50mg (Bonaling-A)	효능	항현훈제, 진훈제
  [50mg]	일반명	디멘하이드리네이트 (dimenhydrinate)
	제약회사	일양약품
	용량/용법	1회 50mg, 1일 3~4회 예방목적으로는 30분~1시간전에 1회 50~100mg
	보험약가	19원/정
	부작용	졸음, 발진, 두통, 가슴앓이
	주의사항	MAO 저해제 투여자, 디페닐메탄계 화합물에 과민증자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
보니아스정 0.3mg (Voneas)	효능	경구혈당강하제
  [0.3mg]	일반명	보글리보스(voglibose)
	제약회사	(주)드림파마
	용량/용법	1회 0.2mg을 1일 3회. 매 식전 경구 투여
	보험약가	170원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	약물 요법을 하지 않는 경우 식사 2시간 후 혈당치가 200mg/dl 이상을 나타내는 경우에 투여. 약물요법을 하고 있는 경우는 공복시 혈당치 140mg/dl이상을 표준으로 함

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(지사제)
비스칸정 83.35mg (Biscan)	효능	지사제, 정장제
   [83.35mg]	일반명	바실러스 , 폴리페르멘티커스 (Bacillus polyfermenticus)
	제약회사	바이넥스
	용량/용법	1회 2정, 1일 3회
	보험약가	70원/정
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
사미온정 5, 10, 30mg (Sermion)	효능	말초혈관 확장제, 뇌기능 개선제
 ID.S [10mg] I D [30mg]	일반명	니세르골린(nicergoline)
	제약회사	일동제약
	용량/용법	1회 5~10mg, 1일 2~3회
	보험약가	246원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	교감신경효능약 투여자, 현저한 서맥 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(제산제)
산화마그네슘정 250, 500mg (Magnesium Oxide)	효능	제산제, 항궤양용제, 하제
 SCD MO [250mg]	일반명	마그네슘 옥시드 (magnesium oxide)
	제약회사	삼청당제약
	용량/용법	1일 0.5~1g을 수회 분복
	보험약가	비보
	부작용	설사
	주의사항	심기능 장애, 고마그네슘혈증 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
살로탄정 50, 100mg (Sarlotan)	효능	혈압강하제(안지오텐신 II 길항제)
 CL 50 [50mg] CLOO [1000mg]	일반명	로살탄 포타슘 (losartan potassium)
	제약회사	종근당
	용량/용법	1일 1회 50mg, 최대 1일 1회 100mg
	보험약가	629원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	이뇨제 투여자, 혈액투석중, 엄격한 염분제한자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진해거담제)
세레타이드 디스커스 100, 250, 500 (Seretide Diskus)	효능	천식 및 만성폐쇄성폐질환 치료제
 [250]	일반명	플루티카손 프로피오네이트 (fluticasone propionate 250ug) 살메테롤 시네포에이트 (salmeterol xinafoate 72.5ug)
	제약회사	글락소 스미스클라인
	용량/용법	살메테롤 50mcg + 프로피온산 플루티카손 250mcg 1일 2회
	보험약가	47,022원/60회/통
	부작용	목주위 가려움
	주의사항	교감신경흥분제에 특이 반응자, 심혈관계질환자 신중투여, 사용후 입안 행구기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(근이완제)
스락신정 10, 25mg (Slaxin)	효능	근이완제, 중추신경용약
 [10mg] [25mg]	일반명	올페나드린 하이드로클로라이드 (orphenadrine hydrochloride)
	제약회사	유영제약
	용량/용법	1회 50mg, 1일 3회
	보험약가	50원/정
	부작용	
	주의사항	중증근무력증, 자발성 운동장애자 투여 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(제산제)
스티렌정 60mg (Stillen)	효능	제산제, 항궤양용제
 [60mg]	일반명	아르테미시에 아시아티카 (artemisiae asiatica 95% ethanol ext.)
	제약회사	동아제약
	용량/용법	1회 1정, 1일 3회
	보험약가	231원/정
	부작용	
	주의사항	혈전환자, 소비성 응고장애자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진정제)
스틸녹스정 10mg (Stilnox)	효능	최면, 진정제
 [10mg]	일반명	졸피뎀 타르트레이트 (zolpidem tartrate)
	제약회사	사노피-아벤티스코리아
	용량/용법	5mg으로 시작 기간 2~4주. 1회 치료기간 4주이내.
	보험약가	324원/정
	부작용	두통, 현기증, 불면증악화
	주의사항	호흡기능 저하시 신중투여, 폐색성 수면무호흡증후군 금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
시그마트정 5mg (Sigmart)	효능	혈관확장제, 협심증 치료제
 [5mg]	일반명	니코란딜(nicorandil)
	제약회사	중외제약
	용량/용법	1회 5mg, 1일 3회
	보험약가	200원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	구연산실데나필, 염산바데나필, 타다라필 복용자 금기, 녹내장, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
시나롱정 5,10mg (Cinalong)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
  CNL 10 [10mg]	일반명	킬니디핀(cilnidipine)
	제약회사	보령제약
	용량/용법	1일 1회 5~10mg
	보험약가	341원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	디히드로피리딘계 약물 과민자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(소화기용제)
(대우)시메티딘정 200, 300mg (Cimettidine)	효능	제산제, 소화성 궤양용제
 [200mg]	일반명	시메티딘(cimetidine)
	제약회사	대우제약
	용량/용법	400mg씩 1일 2회, 또는 800mg씩 1일 1회(취침시), 또는 300mg씩 1일 4회
	보험약가	30원/정
	부작용	여성형 유방, 발진, 숨이 가쁜 증상, 근육통, 두통, 어지러움
	주의사항	신장애, 간장애, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(하제)
실콘정 625mg (Sylcon)	효능	하제, 변비제
 [625mg]	일반명	칼슘 폴리칼보필 (calcium polycarbophil)
	제약회사	한국위너스약품
	용량/용법	1회 2정, 1일 1~4회. 1일 최대 8정
	보험약가	165원/정
	부작용	복통, 구토
	주의사항	카라멜에 과민하거나 알러지 기왕력자 신중투여, 직장 출혈자, 장폐색자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항응고제)
실타졸정 50mg (Ciltazol)	효능	항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제
 C50 HM [50mg]	일반명	실로스타졸(cilostazol)
	제약회사	한미약품
	용량/용법	1회 100mg, 1일 2회
	보험약가	243원/정
	부작용	출혈
	주의사항	출혈 경향 및 소인, 울혈성 심부전자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
심바스타정 20, 40mg (Simvastar)	효능	항고지혈증제, 동맥경화용제
 [20mg] [40mg]	일반명	심바스타틴(simvastatin)
	제약회사	뉴젠팜
	용량/용법	1일 40mg
	보험약가	909원/정
	부작용	근경력, 근육통, 식욕부진, 가려움, 탈모, 마른기침
	주의사항	활동성 간질환 또는 혈청 트란스아미나제치가 원인불명으로 지속적으로 높은 환자 투약 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(알레르기용약)
싱귤레어정 10mg (Singulair)	효능	천식 및 만성폐쇄성폐질환 치료제, 알레르기용약
 [10mg]	일반명	몬테루카스트(montelukast)
	제약회사	씨제이 제일제당 제약사업본부
	용량/용법	1일 1회 10mg 저녁
	보험약가	1,499원/정
	부작용	무력증, 피로, 열, 소화불량, 상기도 감염
	주의사항	아스피린 과민성 환자는 이 약을 복용하는 동안 아스피린 혹은 비 스테로이드성 소염제를 복용 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진통소염제)
써스펜 이알 서방정 650mg(Suspen ER)	효능	비마약성 진통제 및 해열제, 소염제
 [650mg]	일반명	아세트아미노펜 (acetaminophen)
	제약회사	한미약품
	용량/용법	매 8시간마다 2정씩
	보험약가	50원/정
	부작용	출혈, 소화불량
	주의사항	출혈경향자, 혈액이상 또는 기왕력자, 소화성 궤양 기왕력자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
씨스코 이알 서방정 10, 20mg(Syscor ER)	효능	혈압강화제(칼슘길항제)
 [10mg] [20mg]	일반명	니솔디핀(nisoldipine)
	제약회사	현대약품
	용량/용법	1일 1회 10mg 최대 1일 1회 40mg
	보험약가	531원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	리팜피신 병용 투여 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(갑상선기능항진제)
씬지로이드정 0.05, 0.1, 0.15mg (Synthyroid)	효능	갑상선기능항진제
 T4 [0.05mg] SYN [0.1mg] BK 015 [0.15mg]	일반명	레보싸이록신 소듐 (levothyroxine sodium)
	제약회사	부광약품
	용량/용법	1일 1회 25~100mcg, 유지 : 100~400mcg
	보험약가	35원/정
	부작용	무력감, 피로, 변비, 체중증가, 신경예민, 불안/초조, 심계항진
	주의사항	당뇨병, 심혈관계질환자, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □ 관절염 □기타 ( )
아달라트 오로스정 30, 60mg (Adalat Oros)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 [30mg] [60mg]	일반명	니페디핀(nifedipine)
	제약회사	바이엘코리아
	용량/용법	1일 1회 30mg 경과를 보면서 증량함
	보험약가	687원/1정
	부작용	저혈압
	주의사항	리팜피신과 병용 금지

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(비타민제)
아로민정 (Aromin)	효능	비타민 B군(C를 포함)
	일반명	비타민(vitamin B2) 피리독살 포스페이트 (pyridoxal phosphate)
	제약회사	일동제약
	용량/용법	1일 1~2정
	보험약가	비보
	부작용	구역, 구토, 묽은변, 구내염, 식욕부진, 복부팽만감, 감각신경변 증상
	주의사항	레보도파 병용 금지

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
아마릴정 1 .2 .4mg (Amaryl)	효능	경구혈당강하제
 HD 125 [1/250mg] HD 25 [2/500mg]	일반명	글리메피리드(glimepiride)
	제약회사	한독약품
	용량/용법	1일 1회 1mg, 아침 식전
	보험약가	221원/1정
	부작용	저혈당
	주의사항	식사 거른 후 특히 주의

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
아모디핀정 5mg (Amodipin)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 AM5 HMP [5mg]	일반명	암로디핀 캄실레이트 (amlodipine camsylate)
	제약회사	한미약품
	용량/용법	1일 1회 5mg 1일 최대 10mg
	보험약가	396원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	디히드로피리딘계 약물 과민증 기왕력자 금기, 고령자, 투석요하는 신부전증자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
아모린정 1, 2mg (Amorin)	효능	경구혈당강하제
 B E [2mg]	일반명	글리메피리드(glimepiride)
	제약회사	바이넥스
	용량/용법	1일 1회 1mg, 아침식전
	보험약가	177원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	식사거른자, 근육운동과 탄수화물 섭취 불균형자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(천식 및 만성폐쇄성폐질환 치료제)
아미노필린정 100mg (Aminophylline)	효능	천식 및 만성폐쇄성폐질환 치료제, 강심제
 A 100 [100mg]	일반명	아미노필린 (aminophylline)
	제약회사	대원제약
	용량/용법	1일 300~400mg 3~4회 분복
	보험약가	23원/정
	부작용	오심, 구토, 불면, 두통
	주의사항	크산틴계 약물 과민증 자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항응고제)
아스트릭스캡슐 100mg (Astrix)	효능	항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제(혈전용해제)
 AST 100 [100mg]	일반명	아스피린(aspirin)
	제약회사	보령제약
	용량/용법	1일 30~300mg
	보험약가	43원/캡셀
	부작용	출혈
	주의사항	소화성 궤양, 아스피린천식 기왕력자 금기, 기관지천식, 출혈 경향자, 수술전 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타 ( )
아스피린 장용정 100mg (Aspirin Enteric)	효능	항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제(혈전용해제)
 Hanmi ASP100 [100mg]	일반명	아스피린(aspirin)
	제약회사	한미약품
	용량/용법	1일 1회 100mg 최대 300mg
	보험약가	61원/정
	부작용	출혈
	주의사항	다른 살리실산제제에 과민증 기왕력자, 소화성궤양, 아스피린 천식 기왕력자 금기, 출혈경향자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항응고제)
아스피린프로텍트정 100mg (Aspirin Protect)	효능	항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제(혈전용해제)
 Bayer [100mg]	일반명	아스피린(aspirin)
	제약회사	바이엘코리아
	용량/용법	1일 30~300mg
	보험약가	77원/정
	부작용	출혈, 위점막 손상, 위장장애
	주의사항	타 살리실산제제 과민증 기왕력자 금기, 출혈경향자, 수술전, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
아타칸 플러스정 8,16, 32mg (Atacand)	효능	혈압강하제
 A CS	일반명	칸데살탄 실렉세틸 (candesartan cilexedil) 하이드로클로로씨아자이드 (hydrochlorothiazide)
	제약회사	한국아스트라제네카
	용량/용법	식사와 관계없이 , 1일 1회 1정
	보험약가	1,068원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	설폰아마이드 유도체 약물 과민증자 금기, 혈액량감소나 나트륨 결핍자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
아테놀올정 50mg (Atenolol)	효능	혈압강하제(베타차단제)
 [50mg]	일반명	아테놀올(atenolol)
	제약회사	영진약품
	용량/용법	1일 1회 50mg 최대 100mg/dqy
	보험약가	198원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	기관지 천식, 기광지 경련 우려자, 특발성 저혈당증, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
아테놀정50mg (Atenolol)	효능	혈압강하제(베타차단제)
 [50mg]	일반명	아테놀롤(atenolol)
	제약회사	경동제약
	용량/용법	1일 1회 50mg. 단독 또는 이뇨제와 병용
	보험약가	74원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	기관지 천식, 기관지경련 우려자, 특발성 저혈당증 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
아테로정 (Athelo)	효능	혈압강하제(베타차단제)
 NS 50 [50mg]	일반명	아테놀롤(atenolol)
	제약회사	한국넬슨제약
	용량/용법	1일 1회 1정
	보험약가	186원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	설폰아미드계 과민증자, 서맥 있는 사람 투약 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
아토르바정 10, 20mg (Atorva)	효능	항고지혈증제, 동맥경화용제
 YH 10 [10mg]	일반명	아트로바스타틴 칼슘 안하이드로스(atrovastatin calcium anhydrous)
	제약회사	유한양행
	용량/용법	1일 1회 10mg 표준 콜레스테롤 저하식 병행, 식사와 관계없이 투약
 YH 20 [20mg]	보험약가	842원/정
	부작용	횡문근융해증, 간수치 상승
	주의사항	70세를 초과하는 노인으로 횡문근융해증 소인자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
아톨민 에스정 (Atolmin-S)	효능	혈압강하제(베타차단제)
 	일반명	아테놀롤(atenolol)
	제약회사	영풍제약
	용량/용법	1일 1회 1정
	보험약가	203원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	설폰아미드계 약물 과민증자 투여 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(골다공증)
악토넬정 5, 35, 150mg (Actonel)	효능	골다공증 치료 및 예방, 골밀도 유지 또는 증가
  RSN 5mg [5mg]	일반명	리세드로네이트 소듐 (risedronate sodium)
	제약회사	사노피-아벤티스코리아
	용량/용법	5mg 정제 1일 1회 ,아침식사 최소 30분 전 ,또는 식후 2시간 이후 똑 바른 자세에서 물 한컵(120ml)과 함께 복용.
  RSN 35mg [35mg]	보험약가	1,352원/정
	부작용	연하장애, 식도염, 식도궤양, 위궤양
	주의사항	복용후 최소 30분간 눕지 말 것, 30분 이상 똑바로 앉거나 설 수 없는 환자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항응고제)
안플라그정 50, 100mg (Anplag)	효능	항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제(혈전용해제)
 [100mg]	일반명	살포그렐레이트 하이드로클로라이드 (sarpogrelate hydrochloride)
	제약회사	유한양행
	용량/용법	1회 100mg, 1일 3회
	보험약가	799원/정
	부작용	출혈
	주의사항	출혈경향 및 소인자, 항응고제 또는 혈소판응집억제작용이 있는 약제 투여 중인자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항응고제)
안플레이드정 100mg (Anfrade)	효능	항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제(혈전용해제)
 [100mg]	일반명	살포그렐레이트 하이드로클로라이드 (sarpogrelate hydrochloride)
	제약회사	씨제이 제일제당 제약사업본부
	용량/용법	1회 100mg, 1일 3회
	보험약가	679원/정
	부작용	출혈
	주의사항	출혈경향 및 소인자, 항응고제 또는 혈소판응집억제작용이 있는 약제 투여 중인자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
알닥톤 필름코팅정 25mg (Aldactone)	효능	이뇨제
 SEAPLE 39 [25mg]	일반명	스피로놀락톤 (spironolactone)
	제약회사	한국화이자제약
	용량/용법	1일 50~100mg 분복
	보험약가	68원/정
	부작용	고칼륨 혈증, 여성형유방, 설사, 권태감
	주의사항	간, 신기능 장애 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(소화제)
알리아제정 100mg (Aliase)	효능	소화제
 Hw AL [100mg]	일반명	알리벤돌(alibendol)
	제약회사	(주) 드림파마
	용량/용법	1일 300~400mg 3~4회 분복(식전 및 취침시)
	보험약가	79원/정
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(제산제)
알마겔 현탁액 (Almagel)	효능	제산제, 항궤양용제
 [1g/15ml]	일반명	알마게이트(almagate)
	제약회사	유한양행
	용량/용법	1회 1g(포), 1일 4회 식수 1~2시간 및 취침시
	보험약가	141원/15ml/포
	부작용	변비, 설사
	주의사항	테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할수 있으므로 병용 투여 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(제산제)
알비스정 (Albis)	효능	제산제, 항궤양용제
 DW	일반명	비스무쓰 서브시트레이트 (bismuth subcitrate) 라니티딘 하이드로클로라이드 (ranitidine hydrochloride)
	제약회사	대웅제약
	용량/용법	1회 2정, 1일 2회, 오전 및 취침전
	보험약가	486원/정
	부작용	간수치 증가, 위장장애
	주의사항	염산 라니티딘에 대한 과민증 기왕력자 투여 금지

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(뇌기능개선제)
알포아티린 연질캡슐 400mg (Alfoatirin SC)	효능	뇌기능 개선제, 중추신경용약
  YHAF [400mg]	일반명	콜린 알포세레이트 (choline alfoscerate)
	제약회사	유한양행
	용량/용법	1회 1캅셀, 1일 2~3회
	보험약가	663원/캡슐
	부작용	구토
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항불안제)
알프람정 0.25, 0.4, 0.5mg(Alpram)	효능	항불안제, 정신신경용제
 WHANIN [0.4mg]	일반명	알프라졸람(alprazolam)
	제약회사	환인제약
	용량/용법	1회 0.25~0.5mg, 1일 3회. 1일 최대 4mg
	보험약가	77원/정
	부작용	졸음, 유즙분비, 머리가 어질어질함.
	주의사항	벤조디아제핀계 약물 과민증자, 케토코나졸·이트라코나졸 투여자 투약 금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
암로디핀정 5mg (Amlodipine)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 5 KJ AB [5mg]	일반명	암로디핀 베실레이트 (amlodipine besylate)
	제약회사	국제약품공업
	용량/용법	1일 1회 5m, 1일 최대 10mg
	보험약가	355원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	다른 디히드로피리딘계 약물 과민증 기왕력자 금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
암로핀정 5mg (Amlopin)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 AM5 YH [5mg]	일반명	암로디핀 말레이트 (amlodipine maleate)
	제약회사	유한양행
	용량/용법	1일 1회 5mg, 1일 최대 10mg
	보험약가	188원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	디히드로피리딘계 약물에 과민증 기왕력자 금기, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
암피베실정 5mg (Ampibesyl)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 ABL 5 [5mg]	일반명	암로디핀 베실레이트 (amlodipine besylate)
	제약회사	대원제약
	용량/용법	1일 1회 5mg, 1일 최대 10mg
	보험약가	319원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	디히드로피리딘계 약물에 과민증 기왕력자 금기, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
애니디핀정 5mg (Anydipine)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 CKD AD5 [5mg]	일반명	에스-암로디핀 베실레이트 (s-amlodipine besylate)
	제약회사	종근당
	용량/용법	1일 1회 2.5mg, 1일 최대 5mg
	보험약가	419원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	디히드로피리딘계 약물에 과민증 기왕력자 금기, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진해거담제)
액시마정 400mg (Asima)	효능	천식 및 만성폐쇄성폐질환 치료제
 BK DX [400mg]	일반명	독소필린(doxofylline)
	제약회사	부광약품
	용량/용법	1회 1정 1일 2~3회
	보험약가	189원/정
	부작용	부정맥, 발작, 구토, 구역
	주의사항	타 크산틴 유도체 과민증 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
액토스정 15, 30mg (Actos)	효능	경구혈당강하제
 15 ACTOS [15mg] 30 ACTOS [30mg]	일반명	염피오글리타존 (pioglitazone HCL)
	제약회사	한국릴리
	용량/용법	식사와 관계없이 1일 1회 15mg복용. 1일 최대 30mg
	보험약가	968원/정
	부작용	간기능 부전증
	주의사항	정기적으로 간효소 모니터링 필요.

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항우울제)
에나폰정 10mg (Enafon)	효능	우울증, 우울상태, 야뇨증
 [10mg]	일반명	아미트립틸린 하이드로클로라이드(amitriptyline hydrochloride)
	제약회사	환인제약
	용량/용법	1일 30~75mg, 2~3회 분복.
	보험약가	20원/정
	부작용	졸음, 가슴두근거림
	주의사항	MAO저해제 투여자 금기,경련성 질환 또는 기왕력자, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
에란탄 지속정 60mg (Elantan ER)	효능	협심증 치료제, 혈관 확장제
 [60mg]	일반명	이소소르피드-5-모노니트레이트 (isosorbide-5-mononitrate)
	제약회사	경풍약품
	용량/용법	1일 1회 60mg 아침, 1일 최대량 120mg. 분할복용 가능하나, 음료로 반드시 삼킴.
	보험약가	363원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	기립성 조절장애, 뇌혈관질환, 저산소혈증자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(자양강장제)
에보프림연질캡슐 40mg (Evoprim)	효능	당뇨병성 신경증, 알레르기용약
 EVOP [40mg]	일반명	와이-리노레닉 에씨드 (y-linolenic acid)
	제약회사	다림바이오텍
	용량/용법	1회 4~6캡슐 1일 2회
	보험약가	170원/캡셀
	부작용	위장장애
	주의사항	정신분열증 또는 페노치아진과 같이 간질발작 유발이 알려진 약물 투여자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □ 관절염 □기타 ( )
에이스콜정 2mg (Acecol)	효능	혈압강하제(안지오텐신 II 저해제)
 LG T2 [20mg]	일반명	테모카프릴 하이드로클로라이드(temocapril hydrochloride)
	제약회사	엘지생명과학(주)
	용량/용법	1일 1회 2~4mg,
	보험약가	831원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	고칼륨혈증, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항우울제)
에트라빌정 10, 25mg (Etravil)	효능	우울증, 우울상태, 야뇨증
 [10mg] [25mg]	일반명	아미트립틸린 하이드로클로라이드(amitriptyline hydrochloride)
	제약회사	동화약품주식회사
	용량/용법	1일 30~75mg, 2~3회 분복.
	보험약가	20원/정
	부작용	졸음, 가슴두근거림
	주의사항	MAO저해제 투여자 금기,경련성 질환 또는 기왕력자, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
엑스포지정 5/80, 5/160, 10/160mg (Exforge)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 [5/80mg] [5/160mg] [10/160mg]	일반명	암로디핀 베실레이트 (amlodipine besylate)' 발사르탄(valsartan)
	제약회사	한국노바티스
	용량/용법	1일 1회 1정, 가능하면 매일 같은 시간 복용
	보험약가	980원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	본제 투여전 암로디핀 또는 발사르탄으로 용량 조절 권장

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(순환기용제)
엔테론정 50, 150mg (Entelon)	효능	정맥•림프기능부전과 관련된 증상개선, 정맥류용제
 [50mg] [150mg]	일반명	비티스 비니페라 엑스트랙트 (Vitis vinifera extract)
	제약회사	한림제약
	용량/용법	1일 300mg을 2회 분복
	보험약가	229원/정
	부작용	위장장애
	주의사항	

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
오로디핀정 5mg (Orodipine)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 [5mg]	일반명	암로디핀 오로테이트 (amlodipine orotate)
	제약회사	동아제약
	용량/용법	1일 1회 5mg, 1일 최고 10mg
	보험약가	388원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	타 디히드로피리딘계 약물 과민증 기왕력자 금기, 투석을 해야 하는 신부전, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
오마코 연질캡슐 1000mg(Omacor SC)	효능	항고지혈증제, 동맥경화용제
 OMACOR [1000mg]	일반명	오메가-3-에씨드 에틸 에스테르(omega-3-acids ethyl esters)
	제약회사	건일제약
	용량/용법	지질저하 식이요법 반드시 병행, 식사와 함께 복용. 1일 2g, 1일 1~2회
	보험약가	581원/캡슐
	부작용	
	주의사항	생선 과민성 또는 알러지 있는 자, 출혈 고위험 상태 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
올데카캡슐 5, 10, 15mg (Oldeca)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 Hy5 549 [5mg]	일반명	바르니디핀 하이드로클로라이드 (barnidipine hydrochloride)
	제약회사	한국아스텔라스제약
 Hy10 550 [10mg]	용량/용법	1일 5~10mg으로 시작. 1일 1회 10~15mg
	보험약가	544원/캡슐
	부작용	저혈압
 Hy15 551 [15mg]	주의사항	중증 간•신기능 장애자, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
올메텍정 10, 20, 40mg (Olmetec)	효능	혈압강하제(안지오텐신 II 길항제)
 [10mg] [20mg] [40mg]	일반명	올메살탄 메독소밀 (olmesartan medoxomil)
	제약회사	대웅제약
	용량/용법	1일 1회 10mg, 식사여부와 관계없이 투여
	보험약가	520원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	신부전, 과칼륨혈증자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(간보호제)
우루사정 100, 200, 300mg (Ursa)	효능	담석용해제, 간장보호제
 [100mg] [200mg]	일반명	우르소데옥시콜릭 에씨드 (ursodeoxycholic acid)
	제약회사	대웅제약
	용량/용법	1회 50~100mg 1일 3회
	보험약가	111원/정
	부작용	알레르기
	주의사항	알루미늄 함유 제산제 복용 피함

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진통소염제)
울트라셋정 (Ultracet)	효능	비마약성 진통제 및 해열제, 소염제
	일반명	아세트아미노펜(acetaminophen)
	제약회사	한국얀센
	용량/용법	초회량 2정, 투여간격 최소 6시간 이상, 1일 최대 8정
	보험약가	283원/정
	부작용	두드러기, 무력증, 홍조, 두통
	주의사항	MAO억제제 투여자, 아스피린 천식 또는 기왕력자 투여 금기, 모르핀 병용 또는 반복 투여자, 중추신경계 억제제 복용자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
원살탄정 50mg (Wonsartan)	효능	혈압강하제(안지오텐신 II 길항제)
 [50mg]	일반명	로살탄 포타슘 (losartan potassium)
	제약회사	대원제약
	용량/용법	1일 1회 50mg, 최대 1일 1회 100mg
	보험약가	631원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	이뇨제 투여자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
원폴민정 500mg (Wonformin)	효능	경구혈당강하제
 DW 500 [500mg]	일반명	메트폴민 하이드로클로라이드 (metformin hydrochloride)
	제약회사	대원제약
	용량/용법	1일 2~3회, 1일 500mg. 식사와 함께 투약
	보험약가	76원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	식사 섭취량 부족, 격렬한 근육운동 한 사람 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
유니마릴정 2mg (Unimaryl)	효능	경구혈당강하제
 MAR MAR [2mg]	일반명	글리메피리드(glimepiride)
	제약회사	유니메드제약
	용량/용법	1일 1회 1mg, 아침식전
	보험약가	194원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 ■관절염 □기타 ( )
이모튼캡슐 300mg (Imotun)	효능	골관절염, 퇴행성 관절염
 P 300 [300mg]	일반명	아보카도 소야 언사포니피아블(avocado soya unsaponifiables)
	제약회사	종근당
	용량/용법	1일 1회 1캡슐 식간
	보험약가	519원/캡슐
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항응고제)
이부스트린정 200mg (Ibustrin)	효능	항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제(혈전용해제)
 ID.I [200mg]	일반명	인도부펜(indobufen)
	제약회사	일동제약
	용량/용법	1일 200~400mg을 2회 식후 분복
	보험약가	361원/정
	부작용	출혈
	주의사항	위장관 병변, 타항응고제/NSAID 투여시 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
이소켓서방정 40mg (Isoket Retard)	효능	협심증 치료제, 혈관확장제
  [40mg]	일반명	이소소르비드 디니트레이트 (isosorbide dinitrate)
	제약회사	경풍약품
	용량/용법	1일 1회 40mg, 또는 1회 29mg 1일 2회 분복. 최대 1회 49mg 1일 2회
	보험약가	251원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	구연산 실데나필 복용중인 자, 질산염제제 과민증 또는 기왕력자 금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
인데놀정 10,40mg (Indenol)	효능	혈압강하제(베타차단제)
  [10mg] [40mg]	일반명	프로프라놀롤 하이드로클로라이드 (propranolol hydrochloride)
	제약회사	동광제약
	용량/용법	초회:1일 40mg, 1일 2회 유지:1일 120~240mg, 1일 최대 640mg
	보험약가	15원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	특발성 저혈당증, 말초순환장애, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
임듈지속정 60mg (Imdur Durules)	효능	협심증 치료제, 혈관확장제
  [60mg]	일반명	이소소르비드-5-모노니트레이트 (isosorbide-5-mononitrate)
	제약회사	한국아스트라제네카
	용량/용법	1일 1회, 아침에 60mg. 최대 120mg. 초기 2~4일간 30mg.
	보험약가	583원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	기립성 조절장애, 뇌혈관질환, 저산소혈증자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항불안제)
자낙스정 0.25, 0.5mg (Xanax)	효능	항불안제, 정신신경용제
 [0.25mg] [0.5mg]	일반명	알프라졸람(alprazolam)
	제약회사	한국화이자제약
	용량/용법	1회 0.25mg, 1일 2~3회
	보험약가	141원/정
	부작용	졸림, 갈증, 어지러움, 집중곤란, 두통, 발한
	주의사항	벤조디아제핀계 약물 과민증자, 케토코나졸•이트라코나졸 투여자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
자누비아정 25, 50, 100mg (Januvia)	효능	경구혈당강하제
 [25mg] [50mg] [100mg]	일반명	시타글립틴 포스페이트 (sitagliptin phosphate)
	제약회사	한국엠에스디
	용량/용법	1일 1회 100mg.
	보험약가	1020원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	신장애자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
자니딥정 10, 20mg (Zanidip)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 [10mg] [20mg]	일반명	레르카니디핀 하이드로클로라이드 (lercanidipine hydrochloride)
	제약회사	엘지생명과학
	용량/용법	1일 1회 10mg, 식전(최소15분). 1일 최대 20mg
	보험약가	
	부작용	저혈압
	주의사항	디히드로피리딘계 약물 과민증 기왕력자 금기, 갈락토오스 흡수장애 증후군 신중 투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
자이렙 XL서방정 80mg (Xilep XL)	효능	항고지혈증제, 동맥경화용제
 [80mg]	일반명	플루바스타틴(fluvastatin)
	제약회사	엘지생명과학
	용량/용법	1일 1회 20~40mg, 저녁시간 투여. 식사와 관계없이 복용
	보험약가	1,072원/정
	부작용	두통, 피로, 불면 소화불량, 설사, 복통
	주의사항	활동성 간 질환자, 간장에, 지속적으로 혈청 트랜스아미나제가 상승된 자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(통풍치료제)
자이로릭정100mg (Zyloric)	효능	고뇨산증, 통풍 치료제
 GS FE7 [100mg]	일반명	알로표리놀(allopurinol)
	제약회사	삼일제약
	용량/용법	1일 100~300mg.
	보험약가	127원/정
	부작용	속 쓰림, 두통, 설사, 피부 발진
	주의사항	메르캅투푸린 또는 아자치오프린 투여자, 혈액생성장애, 이뇨제나 ACE 저해제 복용중인 고혈압 또는 신부전자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 ■관절염 □기타( )
조인스정 200mg (Joins)	효능	골관절증(퇴행성 관절질환), 류마티스성 관절염의 증상 완화
 S K J200 [200mg]	일반명	Clematis mandshurica, Trichosanthes Kirilowii, Prunella vulgaris.
	제약회사	에스케이케미칼 생명과학부문
	용량/용법	1회 1정, 1일 3회
	보험약가	405원/정
	부작용	
	주의사항	감염상태 또는 감염의 원인이 있는 환자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(대사용제제)
치옥타시드 HR정 200, 600mg (Thioctacid HR)	효능	당뇨병성 다발성 신경염의 완화
 [200mg] [600mg]	일반명	치옥틱 에씨드 (thioctic acid)
	제약회사	부광약품
	용량/용법	1일 1회 600mg. 아침식사 30분전 복용
	보험약가	835원/정
	부작용	
	주의사항	a-lipoic acid 또는 기타 부형제에 대하여 과민증자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(대사용제제)
치옥타시드정 200mg (Thiotacid)	효능	당뇨병성 다발성 신경염의 완화
 [200mg]	일반명	치옥틱 에씨드 (thioctic acid)
	제약회사	부광약품
	용량/용법	1일 200~600mg, 2~3회 분할하여, 식사 30분전 투여
	보험약가	309원/정
	부작용	
	주의사항	본제 과민반응 기왕력자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(순환계용약)
카니틸정 500mg (Carnitil)	효능	뇌기능개선제
 Carnitil [500mg]	일반명	아세틸-엘-카르니틴 하이드로클로라이드 (acetyl-L-carnitine hydrochloride)
	제약회사	한미약품
	용량/용법	1회 500mg, 1일 2~3회
	보험약가	649원/정
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
카두라 XL서방정 4.2mg(Cardura-XL)	효능	혈압강하제(알파차단제)
 CXL 4 [4.2mg]	일반명	독사조신 메실레이트 (doxazosin mesylate)
	제약회사	한국화이자제약
	용량/용법	1일 1회 4mg, 1일 초대 8mg
	보험약가	589원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	퀴나졸린계 약물 과민증자 금기, 급성 심질환시 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
카듀엣정 5/10, 5/20, 5/40mg(Caduet)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 [5/10mg] [5/20mg] [5/40mg]	일반명	암로디핀 베실레이트 (amlodipine besylate)
	제약회사	한국화이자제약
	용량/용법	1일 1회 5mg, 1일 최대 10mg
	보험약가	1,095원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	횡문근융해에 대한 소인자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(칼슘제)
칼디비타츄어블정 (Cal-D-Vita)	효능	비타민을 포함한 칼슘제제
	일반명	칼슘 카르보네이트 (calcium carbonate) 콜레칼씨페롤 (cholecalciferol)
	제약회사	바이엘코리아
	용량/용법	1일 1회 1~2정
	보험약가	159원/정
	부작용	식욕부진, 과칼슘혈증
	주의사항	심장/순환기계기능 장애, 신장애자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
칼리크레인정 10, 25, 50IU (Kalikrein)	효능	말초혈관 확장제, 뇌기능 개선제
 [10IU]  [50IU]	일반명	칼리디노제나아제 (kallidinogenase 10IU)
	제약회사	영풍제약
	용량/용법	10단위 : 1일 30~60IU 3회 분복, 25,50단위 : 1일 30~150IU 3회 분복,
	보험약가	비보
	부작용	마른기침
	주의사항	

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
칼반정 50, 100mg (Calvan)	효능	혈압강하제(베타차단제)
  [50mg] [100mg]	일반명	베반톨롤 하이드로클로라이드(bevantolol hydrochloride)
	제약회사	엘지생명과학(주)
	용량/용법	1일 100mg, 1일 2회 분할 경구 투여, 최대 1일 200mg
	보험약가	538원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	기관지천식, 기관지경련 위험자, 특발성 저혈당증, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 ■관절염 □기타 ( )
케토톱겔30mg/g (Ketotop gel)	효능	퇴행성관절염(골관절염) 진통•소염
 케토톱 겔 50mg [50mg]	일반명	케토프로펜(ketoprofen)
	제약회사	태평양제약
	용량/용법	적량 1일 1~4회 환부 도포
	보험약가	61원/g
	부작용	발진, 두드러기
	주의사항	아스피린 천식 또는 그 기왕력자 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진해거담제)
코대원 시럽 (Codaewon)	효능	기침, 감기용제
	일반명	디하이드로코데인 타르테이트 (dihydrocodeine tartate)
	제약회사	대원제약
	용량/용법	1회 20ml, 1일 3~4회
	보험약가	7원/ml
	부작용	두드러기, 알러지
	주의사항	알러지를 일으키기 쉬운 체질자, 고혈압, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타( )
코데닝정 (Codening)	효능	기침, 감기용제
	일반명	디하이드로코데인 타르테이트 (dihydrocodeine tartate)
	제약회사	종근당
	용량/용법	1회 2정, 1일 3회
	보험약가	28원/정
	부작용	두드러기, 알러지
	주의사항	알러지를 일으키기 쉬운 체질자, 고혈압, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
코디오반정 80/12.5, 160/12.5mg (Codiovan)	효능	혈압강하제(기타)
 [80/12.5mg] [160/12.5mg]	일반명	발살탄(valsartan 80mg) 하이드로클로로씨아자이드 (hydrochlorothiazide 12.5mg)
	제약회사	한국노바티스
	용량/용법	1일 1회 1정.
	보험약가	967원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	설폰아마이드에 과민자 금기, 신•간 손상자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
코스카 플러스정 (Cosca Plus)	효능	혈압강하제(기타)
	일반명	하이드로클로로씨아자이드 (hydrochlorothiazide 12.5mg), 로살탄 포타슘 (losartan potassium)
	제약회사	에스케이케미칼 생명과학부문
	용량/용법	1일 1회 1정
	보험약가	628원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	무뇨증 또는 설폰아미드계 약물 과민증자 금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
코아프로벨정150/12.5, 300/12.5mg (Coaprovel)	효능	혈압강하제(기타)
 [150/12.5mg] [300/12.5mg]	일반명	Irbesartan + Hydrochlorothiazide
	제약회사	사노피아벤티스코리아
	용량/용법	1일 1회 1정
	보험약가	857원/정
	부작용	호흡기감염, 두통, 근골격통, 피로, 설사
	주의사항	임부, 수유부 금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
코자 플러스정 (Cozaar Plus)	효능	혈압강하제(기타)
	일반명	하이드로클로로씨아자이드 (hydrochlorothiazide 12.5mg), 로살탄 포타슘 (losartan potassium)
	제약회사	한국엠에스디
	용량/용법	1일 1회 1정.
	보험약가	784원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	무뇨증 또는 설폰아미드계 약물 과민증자 금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
코-타렉정 80/12.5 160/12.5mg(Co-Tareg)	효능	혈압강하제(기타)
 HGH CG [80/12.5mg] HHH CG [160/12.5mg]	일반명	발살탄(valsartan 80mg) 하이드로클로로씨아자이드 (hydrochlorothiazide 12.5mg)
	제약회사	엘지생명과학(주)
	용량/용법	1일 1회 1정
	보험약가	957원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	설폰아마이드에 과민자 금기, 신•간 손상자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진해거담제)
코푸시럽 (Cough)	효능	기침, 감기용제
	일반명	디하이드로코데인 타르테이트 (dihydrocodeine tartate)
	제약회사	유한양행
	용량/용법	1회 20ml, 1일 3~4회
	보험약가	10원/ml
	부작용	두드러기, 알러지
	주의사항	혈압이 높은 사람, 고령자, 알러지 체질자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
콩코르정 2.5, 5mg (Concor)	효능	혈압강하제(베타차단제)
 [2.5mg] [5mg]	일반명	비소프롤롤 헤미퓨말레이트 (bisoprolol hemifumarate)
	제약회사	머크주식회사
	용량/용법	1일 1회 5~10mg. 아침 공복시 또는 식사시 씹지 않고 복용
	보험약가	366원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	기관지 천식, 기관지 경련 가능성자, 특발성 저혈당증 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(제산제)
큐란정 75, 150, 300mg (Curan)	효능	제산제, 항궤양용제
 [75mg] [150mg] [300mg]	일반명	라니티딘 하이드로클로라이드 (ranitidine hydrochloride)
	제약회사	일동제약
	용량/용법	1회 150mg, 1일 2회 (오전, 취침시)
	보험약가	183원/정
	부작용	발진, 위장장애
	주의사항	NAIDs 병용 투여자, 급성 포르피린증 기왕력자, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항고지혈증제)
크레스토정 5, 10, 20mg (Crestor)	효능	항고지혈증제, 동맥경화용제
 [10mg] [20mg]	일반명	로수바스타틴 칼슘 (rosuvastatin calcium)
	제약회사	한국아스트라제네카
	용량/용법	식사와 관계 없이 투여. 1일 1회 10mg
	보험약가	1,069원/정
	부작용	횡문근 융해증
	주의사항	사이크로스포린 병용 금기,

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항응고제)
크리빅스정 75mg (Clivix)	효능	항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제(혈전용해제)
 [75mg]	일반명	클로피도그렐 하이드로젠 설페이트(clopidogrel hydrogen sulfate)
	제약회사	진양제약
	용량/용법	1일 1회 75mg
	보험약가	1,264원/정
	부작용	출혈
	주의사항	위장관출혈, 출혈경향을 가진 병변 및 출혈 위험 위험 증가자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
타나트릴정 5, 10mg (Tanatril)	효능	혈압강하제(안지오텐신 II 길항제)
 TAN [5mg] TNH [10mg]	일반명	이미다프릴 하이드로클로라이드 (imidapril hydrochloride)
	제약회사	동아제약
	용량/용법	5~10mg 1일 1회
	보험약가	364원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	신기능장애, 고칼륨혈증, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항알러지제)
타리온정 10mg (Talion)	효능	항히스타민제, 항알러지제
 TLT [10mg]	일반명	베포타스틴 베실레이트 (bepotastine besilate)
	제약회사	동아제약
	용량/용법	1회 10mg 1일 2회
	보험약가	272원/정
	부작용	
	주의사항	간•신기능장애, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진통소염제)
타이레놀 이알 서방정 325, 650mg (Tylenol ER)	효능	비마약성 진통제 및 해열제, 관절통의 완화
 [650mg]	일반명	아세트아미노펜 (acetaminophen)
	제약회사	한국얀센
	용량/용법	8시간마다 2정씩
	보험약가	64원/정
	부작용	출혈, 위장장애
	주의사항	아스피린 천식 또는 기왕력자, 혈액이상, 간•신장애, 심기능 부전자 금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
테놀민정 25 50mg (Tenormin)	효능	혈압강하제(베타차단제)
 [25mg] [50mg]	일반명	아테놀롤(atenolol)
	제약회사	현대약품
	용량/용법	1일 1회 50mg. 최대 100mg/day
	보험약가	282원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	기관지천식, 기관지경련 우려자, 특발성 저혈당증, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
테베텐정 600mg (Teveten)	효능	혈압강하제(안지오텐신 II 길항제)
 5046 SOLVAY [600mg]	일반명	에프로살탄(eprosartan)
	제약회사	한독약품
	용량/용법	1일 1회 600mg
	보험약가	786원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	중증 간기능 손상자 금기

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
토렘정 2.5, 5, 10mg (Torem)	효능	이뇨제
 BM B4 [2.5mg] BM C9 [5mg] D7 BM [10mg]	일반명	토라세마이드(torasemide)
	제약회사	파마링크코리아
	용량/용법	1일 2.5mg
	보험약가	188원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	통풍, 신기능저하자, 리튬·아미노글리코시드·세팔로스포린계 약물 병용자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
트리테이스정 2.5, 5mg (Tritace)	효능	혈압강하제(안지오텐신 II 길항제)
 2.5 HMR 2.5 [2.5mg] 5 HMP 5 [5mg]	일반명	라미프릴(ramipril 2.5mg)
	제약회사	한독약품
	용량/용법	1일 1회 2.5mg
	보험약가	530원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	이뇨제 병용투여시 처음 투여한 후 과도한 혈압강하가 나타날 수 있으므로 가능하면 투여 2~3일전 이뇨제 투여 중단

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항우울제)
트리티코정 25, 50mg (Trittico)	효능	항우울제, 정신신경용제
 TTC KJ [25mg] TTC KJ [50mg]	일반명	트라조돈 하이드로클로라이드 (trazodone hydrochloride)
	제약회사	국제약품공업
	용량/용법	반드시 식후 초회 1일 150mg, 3~4일 마다 1일 50mg씩 증량, 1일 최대 400mg
	보험약가	84원/정
	부작용	어지러움, 현기증
	주의사항	심질환, 고령자, 녹내장, 안내압항진 환자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(제산제)
(한미)파모티딘정 20mg (Famotidine)	효능	제산제, 항궤양용제
  [20mg]	일반명	파모티딘(famotidine)
	제약회사	한미약품
	용량/용법	1일 1회 20mg
	보험약가	272원/정
	부작용	
	주의사항	신·간장애, 심질환자, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 ■당뇨병 □관절염 □기타 ( )
파스틱정 30, 90, 120mg (Fastic)	효능	경구혈당강하제
  [90mg]	일반명	나테글리나이트 (nateglinide 90mg)
	제약회사	일동제약
	용량/용법	1회 90mg, 1일 3회, 식사직전
  [120mg]	보험약가	263원/정
	부작용	저혈당
	주의사항	설사·구토 등의 위장장해, 식사거른자, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항알러지제)
페니라민정 2mg (Peniramin)	효능	항히스타민제, 항알러지제
 [2mg]	일반명	클로르페나민 말레이트 (chlorphenamine maleate)
	제약회사	유한양행
	용량/용법	1회 2~6mg, 1일 2~4회, 1일 최대 12정
	보험약가	15원/정
	부작용	발진, 진정, 졸음, 위장장애
	주의사항	안내압상승, 심혈관계질환, 기관지 확장증 및 천식, 타르트라진 과민자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(소화기관용제)
포리부틴정 100, 150mg(Polybutine)	효능	위장관조절제, 항팽만제
 [100mg]	일반명	트리메부틴 말레이트 (trimebutine maleate)
	제약회사	삼일제약
	용량/용법	1회 100~200mg씩 1일 3회 식전
 [150mg]	보험약가	151원/정
	부작용	
	주의사항	

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(골대사제제)
포사맥스플러스정 10, 70mg (Fosamax)	효능	골다공증 치료제
 [70mg]	일반명	알렌드로네이트 소듐 (alendronate sodium)
	제약회사	한국엠에스디
	용량/용법	1주 1회 1정. 아침에 음식물, 음료수 또는 타약물 섭취 최소 30분전 충분한 양의 물과 함께 복용
	보험약가	8,118원/정
	부작용	연하장애, 식도염, 식도궤양, 위궤양
	주의사항	30분 동안 똑바로 앉거나 서 있을 수 없는자, 식도 배출을 지연시키는 식도이상, 저칼슘혈증 금기

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(비뇨생식기관 및 항문용약)
푸로스타정 5mg (Prostar)	효능	방광 및 전립선 질환 치료제
 [5mg]	일반명	피나스테라이드(finastefide)
	제약회사	영풍제약
	용량/용법	1일 1회 5mg, 최소 투여기간 6개월
	보험약가	1,095원/정
	부작용	
	주의사항	간기능 이상자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항응고제)
프레탈정 50, 100mg (Pletaal)	효능	항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제(혈전용해제)
 [100mg]	일반명	클리오타졸(cliotazol)
	제약회사	한국오츠카제약
	용량/용법	1회 100mg, 1일 2회
	보험약가	711원/정
	부작용	
	주의사항	지속적인 혈압 상승 중인 고혈압, 당뇨병이 있는 자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(칼슘제)
프로박스 에프정 830mg (Provax-F)	효능	비타민을 포함한 칼슘제제
 [830mg]	일반명	오소판 서브스턴스 (ssopan substance)
	제약회사	진양제약
	용량/용법	1회 1660~3320mg, 1일 2회 음료와 같이 식전 복용
	보험약가	156원/정
	부작용	고칼슘혈증
	주의사항	강심배당체 투여자, 고용량 비타민 D섭취 금기자, 불화나트륨 복용(최소 3시간 간격), 항알도스테론제·트리암테렌·치아자 이드계 이뇨제 복용자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
프리토정 40, 80mg (Pritor)	효능	혈압강하제(안지오텐신 II 길항제)
 GXE G1 [40mg] GXEF7 [80mg]	일반명	텔미살탄(telmisartan)
	제약회사	글락소 스미스클라인
	용량/용법	1일 1회 40mg, 최대 1일 1회 80mg
	보험약가	798원/정
	부작용	두통, 저혈압
	주의사항	신혈관 고혈압, 간장애, 위장관 질환자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항응고제)
플라메드정 75mg (Plamed)	효능	항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제(혈전용해제)
 1 75 [75mg]	일반명	클로피도그렐 하이드로젠 설페이트(clopidogrel hydrogen sulfate)
	제약회사	고려제약
	용량/용법	1일 1회 1정
	보험약가	634원/정
	부작용	출혈
	주의사항	위장관출혈, 출혈경향을 가진 병변 및 출혈 위험 증가자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항응고제)
플라비톨정 75mg (Plavitor)	효능	항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제(혈전용해제)
 [75mg]	일반명	클로피도그렐 하이드로젠 설페이트(clopidogrel hydrogen sulfate)
	제약회사	동아제약
	용량/용법	1일 1회 75mg
	보험약가	1,734원/정
	부작용	출혈
	주의사항	위장관출혈, 출혈경향을 가진 병변 및 출혈 위험 증가자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(항응고제)
플라빅스정 75mg (Plavix)	효능	항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제(혈전용해제)
 [75mg]	일반명	클로피도그렐 하이드로젠 설페이트(clopidogrel hydrogen sulfate)
	제약회사	사노피-아벤티스코리아
	용량/용법	1일 1회 75mg. 음식물과 상관없이 복용
	보험약가	2,168원/정
	부작용	출혈
	주의사항	위장관출혈, 출혈경향을 가진 병변 및 출혈 위험 증가자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
피록산캡슐200mg (Pirxane)	효능	말초혈관확장제, 뇌기능 개선제
 [200mg]	일반명	buflomedil pyridoxal phosphate(부플로메딜 피리독살 포스페이트)
	제약회사	환인제약
	용량/용법	1일 2~3캡슐을 분복
	보험약가	227원/캡슐
	부작용	저혈압
	주의사항	신부전 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
하이탑핀정 2.5mg (Hytoppin)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
  [2.5mg]	일반명	에스-암로디핀 니코티네이트 (s-amlodipine nicotinate)
	제약회사	신풍제약
	용량/용법	1일 1회 2.5mg, 1일 최대 5mg
	보험약가	418원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	디히드로피리딘계 약물 과민증 기왕력자 금기, 투석해야 하는 신부전자, 고령자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(진정제)
할시온정 0.125, 0.25mg (Halcion)	효능	불면증의 단기간 치료, 진정제
  [0.25mg]	일반명	트리아졸람(triazolam)
	제약회사	한국화이자제약
	용량/용법	단기간(보통 7~10일 투여 치료기간 최대 2~3주 0.125~0.25mg 을 취침전.
	보험약가	135원/정
	부작용	인지기능 장애
	주의사항	타 벤조디아제핀계 약물 과민증자 금기, 항정신병약 항우울약리튬에 의한 급성 중독자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
헤르벤정 30mg (Herben)	효능	혈압강하제(칼슘길항제)
 [30mg]	일반명	딜티아젬 하이드로크로라이드 (diltiazem hydrochloride 30mg)
	제약회사	씨제이 제일제당 제약사업본부
	용량/용법	1일 30~60mg, 1일 3회
	보험약가	88원/정
	부작용	저혈압
	주의사항	울혈성 심부전, 중증 간신부전자 신중투여

〈이름〉	분류	■고혈압 □당뇨병 □관절염 □기타 ( )
후루덱스 서방정 1.5mg (Fludex SR)	효능	이뇨제
 [1.5mg]	일반명	인다파마이드(indapamide)
	제약회사	한국세르비에
	용량/용법	1일 1회(아침) 1정. 씹거나 쪼개지 않고 그대로 복용.
	보험약가	205원/정
	부작용	저혈압, 저나트륨혈증
	주의사항	통풍, 당뇨병, 고칼슘혈증, 염제한요법자 신중투여

〈이름〉	분류	□고혈압 □당뇨병 □관절염 ■기타(무기질제제)
훼로바 유 서방정 80mg(Feroba-U SR)	효능	빈혈용제
 [80mg]	일반명	드라이드 페로스 설페이트 (dried ferrous sulfate)
	제약회사	부광약품
	용량/용법	1회 1정, 1일 1~2회 씹지 않음.
	보험약가	96원/정
	부작용	위장장애, 변비
	주의사항	심장순환기계기능 장애, 신장애자 신중투여

찾아보기

ㄱ

쪽	약명 (한 [영])	효능
14	가나톤정 [Ganaton]	위장관 조절제, 항팽만제
	가바틴캡슐 [Gabatin]	항전간제
	가베스캡슐 [Gaves]	위장관 조절제, 항팽만제
14	가브스정 [Galvus]	경구혈당강하제
15	가스모틴정 [Gasmotin]	위장관 조절제, 항팽만제
15	가스타제정 [Gastase]	소화제
16	가스트렉스과립[Gastase]	제산제, 위궤양치료제
	겔투현탁액 [Gel 2]	제산제, 위궤양치료제
16	고덱스캡슐 [Godex]	간장보호제
	골사민캡슐 [Golsamine]	해열, 소염진통제
17	구루메포민정 [Glumeformin]	경구혈당강하제
	구엔정 [Guen]	칼슘길항제 (혈관확장제)
17	그란닥신정 [Grandaxin]	항불안제
18	그루리스정 [Gluless]	경구혈당강하제
	그루코바이정 [Glucobay]	경구혈당강하제
18	그리메피드정 [Glimepid]	경구혈당강하제
19	그린페지정 [Greenphage]	경구혈당강하제
19	글라디엠정 [Gla-DM]	경구혈당강하제
20	글로슨정 [Glosen]	경구혈당강하제
20	글루딘정 [Gludine]	경구혈당강하제
	글루리스정 [Gluless]	경구혈당강하제

21	글루리아드정 [Gluriad]	경구혈당강하제
21	글루에이서방정 [Glu-A]	경구혈당강하제
	글루코논정 [Gluconon]	경구혈당강하제
22	글루코닐정 [Gluconil]	경구혈당강하제
22	글루코다운오알서방정 [Glucodown OR SR]	경구혈당강하제
23	글루코바이정 [Glucobay]	경구혈당강하제
23	글루코반스정 [Glucovance]	경구혈당강하제
	글루코젠정 [Glucogen	경구혈당강하제
24	글루코파지 XR정 [Glucophage XR]	경구혈당강하제
24	글루코파지정 [Glucophage]	경구혈당강하제
25	글루파정 [Glupa]	경구혈당강하제
25	글루패스트정 [Glufast]	경구혈당강하제
	글리마릴정 [Glimaryl]	경구혈당강하제
	글리메드정 [Glimede]	경구혈당강하제
	글리메릴정 [Glimeri]l	경구혈당강하제
26	글리메피리드정 [Glimepiride]	경구혈당강하제
26	글리멜정 [Glimel]	경구혈당강하제
27	글리민정 [Glimin]	경구혈당강하제
27	글리아티린 캡슐 [Gliatilin]	경구혈당강하제
28	글리원정 [Glyone]	경구혈당강하제
	글리클라짓정 [Gliclazide]	경구혈당강하제
28	글리프릴정 [Glipril]	경구혈당강하제
	기넥신에프정 [Ginexin-F]	순환개선제

ㄴ

쪽	약명 (한 [영])	효능
	나라프릴플러스정 [Narapril plus]	혈압강하제
29	나부톤정 [Nabuton]	소염진통제
	네오나제정 [Neonase]	효소제제
29	네오마릴정 [Neomaryl]	경구혈당강하제
	넥사드정 [Nexad]	순환개선제
30	노바메트지알정 [Novamet GR]	경구혈당강하제
30	노바모핀정 [Novamopin]	혈압강하제 (칼슘길항제)
31	노바스크정 [Norvasc]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	노바스핀정 [Novasphin]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	노바코트정 [Novacot]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	노브카핀정 [Novcapine]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	뉴레보정 [Newlevo]	위장관 조절제, 항팽만제
	뉴렙톨캡슐 [Neuleptol]	항전간제
31	뉴로메드정 [Neuromed]	순환개선제
	뉴로치오에이치알정 [Neurothio HR]	대사제제
32	뉴로파시드정 [Neuropacid]	대사제제
32	뉴론틴캡슐 [Neurontin]	항전간제
	뉴본정50단위 [Newborn]	순환개선제
33	뉴부틴서방정 [Newbutin SR]	위장관 조절제, 항팽만제
	뉴카틴정 [Newcatine]	순환개선제
	니모톱정 [Nimotop]	칼슘길항제(혈관확장제)
33	니세틸정 [Nicetile]	순환개선제

34	니자리딘 캡슐 [Nizaridine]	제산제, 위궤양치료제
34	니트로글리세린정 [Nitroglycerin]	협심증치료제
35	니페론씨알서방정 [Niferon CR]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	닉신 정 [Neekxin]	골격근이완제

ㄷ

쪽	약명 (한 [영])	효능
	다비드정 [Dabide]	항생제 (퀴놀론계)
36	다오닐정 [Daonil]	경구혈당강하제
36	다이미트정 [Daimit]	경구혈당강하제
37	다이아벡스정 [Diabex]	경구혈당강하제
37	다이크로짇정 [Dichlozid]	경구혈당강하제
	다이피릴 정 [Daipiril]	경구혈당강하제
38	단젠정 [Danzen]	효소제제
	대웅알렌드로네이트정 [Alendronate]	골대사제제
	대원클로피도그렐정 [Clopidogrel]	동맥경화용제
	더마톱연고0.25% [Dermatop]	소염진통제
38	더모베이트 연고 [Dermovate]	소염진통제
	데오크레캡슐 [Theoclear]	진해거담제
	데카키논캡슐 [Decaquinon]	강심제
39	데파스정 [Eepas]	항불안제
39	데파코트정 [Depakote]	항전간제
	도란사민캡슐 [Transamin]	지혈제
40	돔필정 [Dompil]	위장관 조절제, 항팽만제

	두소릴캡슐 [Dusoril]	칼슘길항제 (혈관확장제)
40	둘코락스에스정 [Dulcolax-s]	하제, 완장제
41	듀파락시럽 [Duphalac]	하제, 완장제
41	디고신정 [Digosin]	강심제
42	디란트정 [Dirant]	혈압강하제 (베타차단제)
	디메탈정 [Dimetal]	소화제
42	디스그렌캡슐 [Disgren]	항응고제
	디스그렌캡슐 [Disgren]	항응고제
	디스멕정 [Dysmec]	소화제
	디스트린캡슐 [Distrin]	소염진통제
	디아릴 [Diaryl]	경구혈당강하제
43	디아미크롱정 [Diamicron]	경구혈당강하제
	디아민정 [Diamin]	경구혈당강하제
43	디아제팜정 [Diazepam]	항불안제
44	디엔정 [Dien]	말초혈관확장제
44	디오겔현탁액 [Diogel susp]	제산제, 위궤양치료제
	디오마현탁액 [Dioma]	제산제, 위궤양치료제
45	디오반필름코팅정 [Diovan]	혈압강하제(안지오텐신II길항제)
45	디크리핀지속정 [Decreapin SR]	혈압강하제 (칼슘길항제)
46	딜라스트캡슐 [Dilast]	말초혈관확장제
46	딜라트렌정 [Dilatrend]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	딜테란서방캡슐 [Diltelan]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	딜티아젬서방정 [Diltizem]	혈압강하제 (칼슘길항제)

ㄹ

쪽	약명 (한 [영])	효능
	라니드정 [Ranid]	제산제, 위궤양치료제
47	라미실크림 [Lamisil]	항진균제
	라벤다크림 [Lavenda]	항염제
47	라시도필캡슐 [Lacidofil]	지사제
48	라식스정 [Lasix]	이뇨제
48	라피드정 [Rapide]	제산제, 위궤양치료제
	락테올정 [Lacteol]	지사제
49	락토웰 장용캡슐 [Lactowel]	지사제
49	락톨캡슐 [Raktol]	지사제
50	란스톤캡슐 [Lanston]	제산제, 위궤양치료제
50	란투스주 솔로스타 [Lantus Solostar]	인슐린제제
51	레가론캡슐 [Legaron]	간장보호제
	레나르정 [Renale]	해열, 소염진통제
	레날민정 [Renalmin]	혼합비타민
51	레바넥스정 [Revanex]	제산제, 위궤양치료제
	레바미피드정 [Rebamipride]	제산제, 위궤양치료제
	레바미피드정 [Rebamipride]	제산제, 위궤양치료제
	레바미핀정 [Rebamipin]	제산제, 위궤양치료제
	레바스정 [Rebas]	제산제, 위궤양치료제
	레벡스캡슐 [Levex]	간장보호제
	레보렌정 [Levoren]	위장관 조절제, 항팽만제
	레보실정 [Levosil]	위장관 조절제, 항팽만제

52	레보텐션정 [Revotension]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	레보투스시럽 [Levotuss]	진해거담제
52	레보피린정 [Levopirin]	진해거담제
53	레보필정 [Levopil]	위장관 조절제, 항팽만제
53	레브로콜정 [Lebrocol]	진해거담제
	레브록신정 [Levloxin]	항생제 (퀴놀론계)
54	레비셀정 [Lebicel]	간장보호제
54	레스콜 XL 서방정 [Lescol XL SR]	항고지혈증제
	레오빌정 [Reobil]	간장보호제
	레카딘정 [Lecadin]	칼슘길항제 (혈관확장제)
	레칼핀정 [Lecalpin]	칼슘길항제 (혈관확장제)
	레프정 [Lef]	위장관 조절제, 항팽만제
	레피리드정 [Repiride]	위장관 조절제, 항팽만제
55	렉사프로정 [Lexapro]	항우울제
	렉소펜정 [Lexofen]	해열, 소염진통제
	렉토팜정 [Lectopam]	항불안제
	로디엔정 [Lodien]	칼슘길항제 (혈관확장제)
55	로바타딘정 [Lovatadin]	항고지혈증제
	로사타플러스에프정 [Rosata plus F]	항고혈압제
	로우디핀 정 [Lowdipine]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	로자스타정 [Rosastar]	혈압강하제(안지오텐신II길항제)
	로자칼정 [Rozatan Reyon]	혈압강하제(안지오텐신II길항제)
	로자탄정 [Losartan]	혈압강하제(안지오텐신II길항제)
56	로자탐플러스에프정 [Losartam plus F]	혈압강하제(기타)

	로젠스정 [Lozence]	항응고제
56	로피드캡슐 [Lopid]	항고지혈증제
	록소디펜정 [Loxodipain]	해열, 소염진통제
	록소로펜정 [Loxorofen]	해열, 소염진통제
57	록솔정 [Roxol]	진해거담제
	론펙트정 [Ronpect]	진해거담제
57	루마겔 [Rheuma gel]	소염진통제
58	리덕틸캡슐 [Reductil]	비만치료제
58	리리카캡슐 [Lyrica]	중추신경용제
59	리바로정 [Livalo]	항고지혈증제
59	리보트릴정 [Rivotril]	항전간제
	리스페달정 [Risperdal]	항정신용제
	리제정 [Rize]	항불안제
60	리카디핀정 [Licardipine]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	리큅정 [Requip]	항파킨슨제
60	리트모놈정 [Rytmonorm]	부정맥용제
	리포멜즈서방캡슐 [Lipo-Merz SR]	항고지혈증제
61	리포에이 HR정 [Lipo-A HR]	항고지혈증제
	리포에이에이취알정 [Lipo-A HR]	대사제제
61	리피논정 [Lipinon]	항고지혈증제
62	리피딜 슈프라정 [Lipidil supra]	항고지혈증제
62	리피로우정 [Lipilou]	항고지혈증제
	리피스타정 [Lipistar]	항고지혈증제
63	리피칸정 [Lipikhan]	항고지혈증제

63	리피토정 [Lipitor]	항고지혈증제

ㅁ

쪽	약명 (한 [영])	효능
64	마그밀정 [Magmil]	제산제, 위궤양치료제
64	마디핀정 [Madipine]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	맥페란정 [Macferan]	위장관 조절제, 항팽만제
	메가폴민정 [Megaformin]	경구혈당강하제
	메게스트롤 현탁액 [Megestrol BC]	식욕촉진제
65	메디락디에스캡슐 [Medilac-DS]	지사제
65	메디락에스캡슐 [Medilac-S]	지사제
	메로콕스캡슐 [Melocox]	해열, 소염진통제
66	메바로친정 [Mevalotin]	항고지혈증제
	메바로친정 [Mevalotin]	항고지혈증제
	메섹신정 [Mesexin]	항생제 (세팔로스포린계)
	메치코발정 [Methycobal]	비타민 B제제
66	메트그린 SR정 [Metgreen-SR]	경구혈당강하제
67	메티마졸정 [Methimazole]	갑상선기능저하제
	메피리드정 [Glimepiride]	경구혈당강하제
	멕소롱정 [Maxolon]	위장관 조절제, 항팽만제
	멜락스캡슐 [Melax]	해열, 소염진통제
	멜로캄캡슐 [Melocam]	해열, 소염진통제
	멜캄캡슐 [Melcam]	해열, 소염진통제
67	멜콕스캡슐 [Melcox]	해열, 소염진통제

	모노프릴정 [Monopril]	혈압강하제(안지오텐신II 길항제)
	모벡스캡슐 [Mobex]	해열, 소염진통제
	모비캄캡슐 [Mobicam]	해열, 소염진통제
	모빅캡슐 [Mobic]	해열, 소염진통제
68	모티리움 엠정 [Motilitum M]	위장관 조절제, 항팽만제
68	몰시톤정 [Molsiton]	협심증치료제
69	무노발정 [Munobal]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	무코란정 [Mucoran]	제산제, 위궤양치료제
69	무코스타정 [Mucosta]	제산제, 위궤양치료제
	무코신일정 [Mucosinil]	진해거담제
70	뮤렉스정 [Mulex]	근이완제
	뮤코라제정 [Mucolase]	진해거담제
	뮤코스텐캡슐 [Mucosten]	진해거담제
70	뮤코텐정 [Mucoten]	진해거담제
71	뮤테란캡슐 [Muteran]	진해거담제
71	미아릴정 [Miaryl]	경구혈당강하제
	미야정 [Miya]	지사제
72	미오날정 [Myonal]	근이완제
72	미카르디스플러스정 [Micardis plus]	혈압강하제(안지오텐신II 길항제)

ㅂ

쪽	약명 (한 [영])	효능
	바나제정 [Vanase]	진해거담제
	바로스크정 [Varosc]	혈압강하제 (칼슘길항제)

	바리다제정 [Varidase]	진해거담제
73	바리움정 [Valium]	항불안제
	바미드정 [Bamide]	제산제, 위궤양치료제
73	바소트롤정 [Vasotrol]	혈압강하제 (베타차단제)
74	바소트리정 [Vasotri]	협심증치료제
74	바스티난정 [Vastinan]	협심증치료제
	바스핀지속정 [Vaspine]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	바이로틴정 [Birotin]	항고지혈증제
	바이칸캡슐 [Bycan]	지사제
	바젠씨정 [Vazen-C]	혼합비타민
	박사르정 [Vaxar]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	베글리스정 [Veglis]	경구혈당강하제
	베니톨정 [Venitol]	정맥류용제
	베라스톨린정 [Berastolin]	말초혈관확장제
	베라실정 [Berasil]	말초혈관확장제
	베로텍정 [Berotec]	진해거담제
75	베셀듀에스 연질캡슐 [Vessel Due F]	항응고제
	베스자임정 [Beszyme]	소화제
	베스타제정 [Bestase]	소화제
	베시케어정 [Vesicare]	방광 및 전립선 치료제
75	베아디핀정 [Beardipine]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	베아트라정 [Beartra]	해열, 소염진통제
76	베이슨정 [Basen]	경구혈당강하제
	베타덤지크림 [Betterderm-G]	외용약

	벤토린 에보할러 [Ventolin Evohaler]	진해거담제
76	벤투룩스캡슐 [Ventrux]	지사제
77	보글리코스정 [Voglicose]	경구혈당강하제
77	보나링에이정 [Bonaling-A]	항현훈제
78	보니아스정 [Voneas]	경구혈당강하제
	보라드정 [Vorad]	위장관 조절제, 항팽만제
	브로라인장용정 [Brolain]	부종성 염증완화
	비스루트에스정 [Bisroot S]	지사제
78	비스칸정 [Biscan]	지사제
	비오딘에스캡슐 [Biodin S]	지사제
	비유피-4정 [BUP-4]	방광 및 전립선 치료제
	비타메진캡슐 [Vitamedin]	비타민 B제제
	비펜카타플라스마 [Bifen Cataplasma]	소염진통제

ㅅ

쪽	약명 (한 [영])	효능
79	사미온정 [Sermion]	말초혈관확장제
	사포레이트정 [Sarpolate]	항응고제
79	산화마그네슘정 [Magnesium Oxide]	제산제, 위궤양치료제
80	살로탄정 [Sarlotan]	혈압강하제(안지오텐신II길항제)
	설벡스캡슐 [Selbex CJ]	제산제, 위궤양치료제
80	세레타이드 디스커스 [Seretide Diskus]	천식 및 COPD 치료제
	세로필캡슐 [Cerophyl]	천식 및 COPD 치료제
	세론정 [Seron]	항불안제

	세비카정 [Sevika]	혈압강하제 (기타)
	세티리진정 [Cetirizine]	항히스타민제
	센시발성 [Sensival]	항우울제
	셀벡스캡슐 [Selbex]	제산제, 위궤양치료제
	셀벡스캡슐 [Selbex]	제산제, 위궤양치료제
	소담캡슐 [Sodam]	진해거담제
	소멕스정 [Somax]	말초혈관확장제
	소하벤돌정 [Sohabendol]	소화제
	슈프락스캡슐 [Suprax]	항생제 (세팔로스포린계)
	슈프락스캡슐 [Suprax]	항생제 (세팔로스포린계)
81	스락신정 [Slaxin]	근이완제
	스카드정 [Skad]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	스타레보필름코팅정 [Stalevo film coated]	항파킨슨제
81	스티렌정 [Stillen]	제산제, 위궤양치료제
82	스틸녹스정 [Stilnox]	최면진정제
	스프렌딜 지속정 [Splendil ER]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	스피리바 흡인용캡슐 [Spiriva]	천식 및 COPD 치료제
	스피틴정 [Speetin]	항고지혈증제
82	시그마트정 [Sigmart]	협심증치료제
83	시나롱정 [Cinalong]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	시너젯정 [Synerjet]	해열, 소염진통제
	시네메트정 [Sinemet]	항파킨슨제
83	시메티딘정 [Cimettidine]	제산제, 위궤양치료제
	시트라칼에프정 [Sitracal F]	칼슘제

	신일엠정 [Sinil-M]	제산제, 위궤양치료제
	신코나졸캡슐 [Sinconazole]	항진균제
	실로탈정 [Cilotal]	항응고제
84	실콘정 [Sylcon]	하제, 변비제
84	실타졸정 [Ciltazol]	항응고제
	심바로드정 [Simvalord]	항고지혈증제
85	심바스타정 [Simvastar]	항고지혈증제
	심콜정 [Simcol]	항고지혈증제
85	싱귤레어정 [Singulair]	천식 및 COPD 치료제
86	써스펜이알서방성 [Suspen ER]	소염진통제
	쏘롱정 [Solong]	제산제, 위궤양치료제
86	씨스코이알서방정 [Syscor ER]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	씨엔정 [Cien]	말초혈관확장제
87	씬지로이드정 [Synthyroid]	갑상선기능항진제

○

쪽	약명 (한 [영])	효능
	아기오과립 [Agio]]	하제, 변비제
	아나딥정 [Anadip]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	아놀민정 [Anolmin]	혈압강하제 (베타차단제)
88	아달라트오로스정 [Adalat Oros]	혈압강하제 (칼슘길항제)
88	아로민정 [Aromin]	비타민 B제제
	아리셉트정 [Aricep]	치매증상 치료제
89	아마릴정 [Amaryl]	경구혈당강하제

89	아모디핀정 [Amodipin]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	아모리아캡슐 [Amoria]	해열, 소염진통제
90	아모린정 [Amorin]	경구혈당강하제
	아모잘탄정 [Amosartan]	혈압강하제 (기타)
90	아미노필린정 [Aminophylline]	천식 및 COPD 치료제
	아반다릴정 [Avandaryl]	경구혈당강하제
	아반다메트정 [Avandamet]	경구혈당강하제
	아반디아정 [Avandia]	경구혈당강하제
	아벨라정 [Abella]	소화제
	아서틸정 [Acertil]	혈압강하제 (ACE 저해제)
	아세렌캡슐 [Aceren]	소염진통제
	아스테롤정 [Asthterol]	천식 및 COPD 치료제
91	아스트릭스캡슐 [Astrix]	항응고제
91	아스피린장용정 [Aspirin Enteric]	항응고제
92	아스피린프로텍트정 [Aspirin Protect]	항응고제
	아시스캡슐 [Acis]	진해거담제
	아시토바과립 [Acitoba]	지사제
	아젭틴정 [Azeptin]	항히스타민제
	아진탈정 [Azintal]	소화제
	아크로펜정 [Aclofen]	해열, 소염진통제
92	아타칸 플러스정 [Atacand]	혈압강하제 (기타)
	아테나정 [Atena]	혈압강하제 (베타차단제)
93	아테놀올정 [Atenol]	혈압강하제 (베타차단제)
93	아테놀정 [Atenolol]	혈압강하제 (베타차단제)

	아테로이드연질캡슐 [Ateroid SC]	항응고제
94	아테로정 [Athelo]	혈압강하제 (베타차단제)
	아토르바스타틴정 [Atorvastatin]	항고지혈증제
94	아토르바정 [Atorva]	항고지혈증제
95	아톨민에스정 [Atolmin-S]	혈압강하제 (베타차단제)
	아트로다캡슐 [Artrodar]	소염진통제
	아티반정 [Ativan]	항불안제
	아프로벨정 [Aprovel]	혈압강하제(안지오텐신II길항제)
95	악토넬정 [Actonel]	골대사제제
	악토릴정 [Actoril]	골대사제제
	안트롬정 [Anthrom]	항응고제
	안프란정 [Anpran]	항응고제
96	안플라그정 [Anplag]	항응고제
96	안플레이드정 [Anfrade]	항응고제
97	알닥톤필름코팅정 [Aldactone]	이뇨제
	알드린정 [Aldrin]	제산제, 위궤양치료제
	알레지온정 [Alesion]	항히스타민제
	알리신정 [Alisin]]	소화제
97	알리아제정 [Aliase]	소화제
	알마게이트정 [Almagate]	제산제, 위궤양치료제
98	알마겔현탁액 [Almagel]	제산제, 위궤양치료제
98	알비스정 [Albis]	제산제, 위궤양치료제
	알파부틴연질캡슐 [Alphabutin]	제산제, 위궤양치료제
99	알포아티린연질캡슐 [Alfoatirin SC]	중추신경용제

99	알프람정 [Alpram]	항불안제
	알프존엑스엘정 [Alfuzon XL]	방광 및 전립선 치료제
100	암로디핀정 [Amlodipine]	혈압강하제 (칼슘길항제)
100	암로핀정 [Amlopin]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	암로핀캡슐 [Amlopin]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	암브로콜정 [Ambrocol]	진해거담제
101	암피베실정 [Ampibesyl]	혈압강하제 (칼슘길항제)
101	애니디핀정 [Anydipine]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	애드칼정 [Adcal]	칼슘제
	애피드라주솔로스타 [Apidra Inj Solostar]	인슐린제제
102	액시마정 [Asima]	천식 및 COPD 치료제
102	액토스정 [Actos]	경구혈당강하제
	액토존정 [Actozon]	경구혈당강하제
	액토존정 [Actozon]	경구혈당강하제
	액티글리정 [Actigli]	경구혈당강하제
	액피오정 [Acpio]	경구혈당강하제
103	에나폰정 [Enafon]	항우울제
103	에란탄지속정 [Elantan ER]	협심증치료제
	에르카핀정 [Ercapin]	혈압강하제 (칼슘길항제)
104	에보프림연질칼셀 [Evoprim]	당뇨병성 신경증
	에스시탈정 [Escital]	항우울제
104	에이스콜정 [Acecol]	혈압강하제(안지오텐신II길항제)
	에이핀정 [A-Pine]	혈압강하제 (칼슘길항제)
105	에트라빌정 [Etravil]	항우울제

	에페리손정 [Eperisone]	근이완제
	에페리정 [Eperi]	근이완제
105	엑스포지정 [Exforge]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	엑시캄캡슐 [Exicam]	해열, 소염진통제
	엔시트라정 [Ensitra]	해열, 소염진통제
106	엔테론정 [Entelon]	순환개선제
	엔티스캡슐 [Entis]	정맥류용제
	엘도스캡슐 [Erdos]	진해거담제
	엘로톤정 [Elroton]	협심증치료제
	엘포날정 [Elfonal]	혈압강하제 (ACE 저해제)
	염산메트포르민정 [Metformin Hcl]	경구혈당강하제
106	오로디핀정 [Orodipine]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	오르필서방정 [Orfil SR]	항전간제
107	오마코연질캡슐 [Omacor SC]	항고지혈증제
	오메존캡슐 [Omezon]	제산제, 위궤양치료제
	오스테민캡슐 [Ostemin]	해열, 소염진통제
	오잘탄플러스정 [Osartan Plus]	혈압강하제 (기타)
	오팔몬정 [Opalmon]	순환개선제
	옥시크로린정 [Oxiklorin]	항말라리아제,항류마티스제제
	옥티란정 [Octiran]	진경제
107	올데카캡슐 [Oldeca]	혈압강하제 (칼슘길항제)
108	올메텍정 [Olmetec]	혈압강하제(안지오텐신II길항제)
	옴펠정 [Ompel]	위장관 조절제, 항궤만제
	왈파정 [Warfar]	항응고제

108	우루사정 [Ursa]	소화제
109	울트라셋정 [Ultracet]	소염진통제
	원베롤정 [Wonvelol]	혈압강하제 (베타차단제)
109	원살탄정 [Wonsartan]	혈압강하제(안지오텐신II길항제)
	원탁정 [Wontac]	제산제, 위궤양치료제
110	원폴민정 [Wonformin]	경구혈당강하제
	유글렉스정 [Euglex]	경구혈당강하제
	유니그릴정 [Unigril]	항응고제
110	유니마릴정 [Unimaryl]	경구혈당강하제
	유니바스크정 [Univasc]	혈압강하제 (ACE 저해제)
	유니필서방정 [Uniphyl SR]]	진해거담제
	유벤돌정 [UBendol]	소화제
111	이모튼캡슐 [Imotun]	관절염치료제
	이부네인정 [Ibunein]	말초혈관확장제
111	이부스트린정 [Ibustrin]	항응고제
112	이소켓서방정 [Isoket Retard]	협심증치료제
	이소탄정 [Isotan]	항불안제
	이소트릴지속정 [ ]	
	이연로자탄정 [Isotril]	협심증치료제
	이텍스나부메톤정 [Nabumetone Etex]	해열, 소염진통제
112	인데놀정 [Indenol]	혈압강하제 (베타차단제)
	인히베이스정 [Inhibace]	혈압강하제 (ACE 저해제)
113	임듈지속정 [Imdur Durules]	협심증치료제

ㅈ

쪽	약명 (한 [영])	효능
114	자낙스정 [Xanax]	항불안제
114	자누비아정 [Januvia]	경구혈당강하제
115	자니딥정 [Zanidip]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	자니핀정 [Zanipin]	혈압강하제 (칼슘길항제)
115	자이렙엑스엘서방정 [Xilep XL]	항고지혈증제
116	자이로릭정 [Zyloric]	통풍치료제
	자이로릭정 [Zyloric]	통풍치료제
	제이딘정 [Jeidin]	제산제, 위궤양치료제
	제이옥틴정 [J-Octin]	대사제제
116	조인스정 [Joins]	관절염치료제
	조코나정 [Zocona]	항고지혈증제
	조타정 [Zota]	항고지혈증제
	졸피람정 [Zolpiram]	최면진정제
	지셀연질캡슐 [G-Cell SC]	간장보호제
	지트람엑스서방정 [Zytram XL CR]	해열, 소염진통제
	진트로이정 [Jitoloy]	위장관 조절제, 항궤만제

ㅊ

쪽	약명 (한 [영])	효능
117	치옥타시드에이취알정 [Thioctacid HR]	당뇨병성 신경증
117	치옥타시드정 [Thiotacid]	당뇨병성 신경증

ㅋ

쪽	약명 (한 [영])	효능
118	카니틸정 [Carnitil]	순환개선제
118	카두라 XL서방성 [Cardura-XL]	혈압강하제 (알파차단제)
119	카듀엣정 [Caduet]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	카딜렌 [Cadilen]	혈압강하제 (베타차단제)
	카르베롤정 [Carvelol]	혈압강하제 (베타차단제)
	카리나제정 [Carinase]	말초혈관확장제
	카바몰정 [Carbamol]	근이완제
	카베올정 [Carbeol]	혈압강하제 (베타차단제)
	카슈트현탁액 [Casuit]	해독제
	카포짓정 [Capozit]	혈압강하제 (기타)
119	칼디비타 츄어블정 [Cal-D-Vita]	칼슘제
120	칼리크레인정 [Kalikrein]]	말초혈관확장제
120	칼반정 [Calvan]	혈압강하제 (베타차단제)
	칼테오정 [Calteo]	칼슘제
	칼페롤정 [Calferol]	칼슘제
	케어본정 [Carebone]	칼슘제
	케이디핀지속정 [Keydipin]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	케타스캡슐 [Ketas]	말초혈관확장제
121	케토톱겔 [Ketotop gel]	소염진통제
	켈론정 [Kerlone]	혈압강하제 (베타차단제)
	켈론정 [Kerlone]	혈압강하제 (베타차단제)
	코니엘정 [Coniel]	혈압강하제 (칼슘길항제)

121	코대원시럽 [Codaewon]	진해거담제
	코데날정 [Codenal]	진해거담제
122	코데닝정 [Codening]	진해거담제
122	코디오반정 [Codiovan]	혈압강하제 (기타)
	코빅스정 [Kovix]	항응고제
123	코스카플러스정 [Cosca Plus]	혈압강하제 (기타)
123	코아프로벨정 [Coaprovel]	혈압강하제 (기타)
	코자르탄정 [Cozartan]	혈압강하제 (안지오텐신II길항제)
124	코자플러스정 [Cozaar Plus]	혈압강하제 (기타)
124	코-타렉정 [Co-Tareg]	혈압강하제 (기타)
125	코푸시럽 [Cough]	기침감기용제
125	콩코르정 [Concor]	혈압강하제 (베타차단제)
	쿠마딘정 [Coumadin]	항응고제
126	큐란정 [Curan]	제산제, 위궤양치료제
	크라빅스정 [Cravix]	항응고제
	크레보릴에스캡슐 [Cleboril-S]	위장관 조절제, 항팽만제
126	크레스토정 [Crestor]	항고지혈증제
127	크리빅스정 [Clivix]	항응고제
	클란자에스연질캡슐 [Clanza S SC]	해열, 소염진통제

ㅌ

쪽	약명 (한 [영])	효능
	타가메트정 [Tagamet]	제산제, 위궤양치료제

128	타나트릴정 [Tanatril]	혈압강하제(안지오텐신II길항제)
	타록시드정 [Taruksid]	항생제 (퀴놀론계)
128	타리온정 [Talion]	항히스타민제
129	타이레놀이알서방정 [Tylenol ER]	소염진통제
	타지딘정 [Tagidine]	협심증치료제
	탈니프정 [Talnif]	해열, 소염진통제
129	테놀민정 [Tenormin]	혈압강하제 (베타차단제)
130	테베텐정 [Teveten]	혈압강하제(안지오텐신II길항제)
	테올란-비서방캡슐 [Theolan-B SR]	진해거담제
	테프라정 [Tepra]	혈압강하제 (베타차단제)
	테프론정 [Tepuron]	제산제, 위궤양치료제
	토라정 [Tora]	이뇨제
130	토렘정 [Torem]	이뇨제
	토르세미드정 [Torsemide]	이뇨제
	토르셈정 [Torsem]	이뇨제
	토바스트정 [Tovast]	항고지혈증제
	토푸릴정 [Topuril]	혈압강하제(안지오텐신II길항제)
	토핌정 [Tofim]	항불안제
	트렌탈400서방정 [Trental]	말초혈관확장제
	트리신정 [Tricin]	위장관 조절제, 항팽만제
	트리아핀정 [Triapin]	혈압강하제 (기타)
	트리진정 [Trizine]	협심증치료제
131	트리테이스정 [Tritace]	혈압강하제(안지오텐신II길항제)
131	트리티코정 [Trittico]	항우울제

	트리헥신정 [Trihexine]	항파킨슨제
	티로파정 [Tiropa]	진경제
	티오시드정 [Thiocid]	대사제제
	티프로정 [Tipro]	진경제

ㅍ

쪽	약명 (한 [영])	효능
	파라마셋정 [Paramacet]	해열, 소염진통제
132	파모티딘정 [Famotidine]	제산제, 위궤양치료제
132	파스틱정 [Fastic]	경구혈당강하제
	파티겔정 [Patigel]	제산제, 위궤양치료제
	판부론정 [Panburon]	위장관 조절제, 항팽만제
	페노디핀지속정 [Fenodepine ER]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	페노피딜캡슐 [Fenopidil]	항고지혈증제
133	페니라민정 [Peniramin]	항히스타민제
	페니토인정 [Phenytoin]	항전간제
	페리날정 [Perinal]	위장관 조절제, 항팽만제
	펜넬캡슐 [Pennel]	간장보호제
	펜타올정 [Pentaol]	소화제
	펠돈-티정 [Feldon-T]	위장관 조절제, 항팽만제
	펠로디핀정 [felodepine Binex]	혈압강하제 (칼슘길항제)
133	포리부틴정 [Polybutine]	위장관 조절제, 항팽만제
134	포사맥스플러스정 [Fosamax]	골다공증 치료제

	폴리판연질캡슐 [Polypan]	소화제
	푸가졸캡슐 [Fugazole]	항진균제
134	푸로스타정 [Prostar]	방광 및 전립선 치료제
	프라놀 [Pranol]	부정맥용제 (베타차단제)
	프라스탄정 [Pranstan]	항고지혈증제
135	프레탈정 [Pletaal]	항응고제
135	프로박스에프정 [Provax-F]	칼슘제
	프로이머정 [Proimer]	항파킨슨제
136	프리토정 [Pritor]	혈압강하제(안지오텐신II길항제)
136	플라메드정 [Plamed]	항응고제
137	플라비톨정 [Plavitor]	항응고제
137	플라빅스정 [Plavix]	항응고제
138	피륵산캡슐 [Pirxane]	말초혈관확장제
	피오글리존정 [Pioglizone]	경구혈당강하제
	핀테졸정 [Pantezol]	제산제, 위궤양치료제

ㅎ

쪽	약명 (한 [영])	효능
	하루날디정 [Harnal D]	방광 및 전립선 치료제
139	하이탑핀정 [Hytoppin]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	할로핀 정 [Halopin]	혈압강하제 (칼슘길항제)
139	할시온정 [Halcion]	진정제
	헤르벤서방정 [Herben Retard]	혈압강하제 (칼슘길항제)

140	헤르벤정 [Herben]	혈압강하제 (칼슘길항제)
	헤파멜즈산 [Hepa-Merz]	간장보호제
140	후루덱스서방정 [Fludex SR]	이뇨제
	후코날크림0.5% [Fukonal]	항진균제
141	훼로바유서방정 [Feroba-U SR]	빈혈치료제